herpy

SALAMANDRE

Black Knobby Newt

Tylototriton asperrimus

Tylototriton asperrimus er en mørk, vortet krokodillesalamander på 12-15 cm med knoppede ribbenspukler og kraftige rygkamme. Arten lever i fugtige bjergegne i den kinesiske provins Guangxi og har givet navn til en hel gruppe af nærtbeslægtede krokodillesalamandre, som først for nylig er skilt ud som selvstændige arter.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Echinotriton asperrimus; Pleurodeles asperrimus* Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-15 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Vanddel** dybde 1-5 cm
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**8-12 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. sæson	**30-80**
Klækning	**20-36 dage** ved 22-24 °C
Larvetid	**50-110 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Hele slægten Tylototriton står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97). Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver tilladelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen salamandre står på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen ved import eller handel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Tylototriton asperrimus*.
TEMPERATUR	Om sommeren holdes terrariet på 20-24 °C om dagen og 18-21 °C om natten, hvilket svarer til sommeren i udbredelsesområdet.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden er 80-100 %. Terrariet sprøjtes dagligt med en blomstersprøjte, og der skal være både fugtigere og tørrere zoner, så luften ikke står stille.
VAND OG VANDKVALITET	Vanddelen skal have blødt, svagt surt vand; regnvand eller osmosevand passer. Vandets pH er ikke dokumenteret for *Tylototriton asperrimus*; *Tylototriton ziegleri* holdes ved pH 6,4-6,8. Brug aldrig postevand uden at fjerne klor.
LYS OG UVB	Lyset har ikke særlig betydning for dyrene og rettes efter planterne: LED-bånd eller lysstofrør i 12 timer om sommeren og 10-11 timer om vinteren. UVB er ikke nødvendigt for den skjultlevende art.
FODER	Voksne får bladorme, fårekyllinger, husfårekyllinger, voksmøllarver, regnorme og isopoder i passende størrelse omkring to gange om ugen. Om vinteren æder de uregelmæssigt og meget mindre.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Hos de nærtbeslægtede arter lever dyrene meget skjult og ses mest, når der fodres, eller når hannerne er i vandet. Par eller små grupper kan holdes sammen i et rummeligt terrarie med mange skjul.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina.