herpy

SALAMANDRE

Guizhou Crocodile Newt

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis er en kraftig, sortbrun krokodillesalamander på 15-21 cm med tre brede orange til rødlige striber langs kroppen. Den lever på land i bjergene i Guizhou og Yunnan og går mest i vandet for at yngle. Den passes bedst i et stort terrarie med både land og vand.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Pleurodeles kweichowensis* Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-21 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Bjergskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 10-15 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**På blade over vand**
Æg pr. sæson	**50-150**
Lægninger pr. år	**1**
Klækning	**10-12 dage** ved 25 °C
Larvetid	**80-100 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Tylototriton står på CITES liste II og i EU's bilag B. Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Arten står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; Fødevarestyrelsen kan oplyse om de aktuelle regler ved import og handel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Tylototriton kweichowensis* skal have et stort terrarie, fordi dyrene er store og tunge, har brug for et solidt landareal med et skjul til hvert dyr og skal have vand nok til både yngel og et filter.
TEMPERATUR	Arten trives ved almindelig stuetemperatur: 23-26 °C om sommeren og 15-20 °C om vinteren. Boksens dagtemperatur er 18-25 °C og nattemperaturen 15-20 °C. Varmere end omkring 26 °C bør det ikke blive i længere tid.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal være høj, men bunden ikke våd; 70-90 % er et skøn. Landdelen holdes fugtig uden at blive mudret, og en del af bunden må gerne være tørrere.
VAND OG VANDKVALITET	Vanddelen fylder omtrent halvdelen af terrariet. Dybden er ikke dokumenteret for arten; 10-15 cm er lånt fra *Tylototriton verrucosus*. Brug afkloreret postevand og et stille filter, der ikke laver stærk strøm.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendigt, og arten er mest aktiv i skumringen og om natten.
FODER	Voksne dyr får hakkede regnorme, fårekyllinger og andre byttedyr af passende størrelse. Voksmøllarver og andre fede larver er yndede, men skal ikke være basisfoder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er langsom og klodset. 2-3 dyr kan holdes sammen, når der er skjul nok til hvert dyr.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina.