herpy

SALAMANDRE

Emperor Crocodile Newt

Tylototriton shanjing

Tylototriton shanjing er en kraftig, mørkebrun krokodillesalamander fra Yunnan i Sydvestkina med lysende orange hoved, rygkam, kirtelvorter og hale. Den bliver 12-20 cm, lever næsten hele året på land og går kun i vandet for at yngle. Dyret er roligt og hårdført, men huden udskiller et giftigt sekret, så hænderne skal vaskes efter al kontakt.

Familie: Salamandridae Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-20 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Bjergskov**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**24 mdr.**
Æg pr. sæson	**30-150**
Klækning	**10-12 dage** ved 22-25 °C
Larvetid	**90-150 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**75 × 30 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Tylototriton står på CITES liste II og i EU's bilag B. Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Arten står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; Fødevarestyrelsen kan oplyse om de aktuelle regler ved import og handel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Tylototriton shanjing* er en landsalamander, der kun har brug for vand i yngletiden. Fire voksne dyr kan holdes i et terrarie på 75 × 30 × 30 cm; gulvareal er vigtigere end højde, og et par skal have mindst 60 × 30 cm.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen er 18-25 °C og nattemperaturen 15-20 °C. Om vinteren holdes dyrene køligere, omkring 15-17 °C, og på en tørrere bund; om sommeren må det gerne blive 24-26 °C.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Arten foretrækker forholdsvis tørre forhold, tørrere end andre landlevende krokodillesalamandre. 60-80 % luftfugtighed er et skøn. Sprøjt let, så den våde ende af bunden altid er fugtig, og lad den tørre ende være tør.
VAND OG VANDKVALITET	Uden for yngletiden er vandet en lav skål med skrå sider og afkloreret postevand, som skiftes jævnligt. I yngletiden skal der være et større vandparti på mindst 30 × 30 cm (se "Parring"). Padders hud er meget gennemtrængelig.
LYS OG UVB	*Tylototriton shanjing* er skumrings- og nataktiv og lever skjult, så den kommer sjældent frem, mens lyset er tændt. UVB er ikke nødvendigt. Lyset er til planterne; en LED-pære, der næsten ikke varmer, er nok.
FODER	Regnorme er det bedste basisfoder; store regnorme skæres i passende stykker. Små fårekyllinger er et godt supplement, når de selv er godt fodrede, og voksmøllarver og melorme kan gives som afveksling, men ikke som hovedføde.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret er roligt og langsomt og kan blive meget tamt: mange tigger om foder ved ruden, når de har vænnet sig til deres holder. Det er alligevel ikke et dyr til daglig håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina.