herpy

SALAMANDRE

Himalayan Crocodile Newt

Tylototriton verrucosus

Tylototriton verrucosus er en stor, mørkebrun krokodillesalamander fra bjergene i det vestlige Yunnan, det nordlige Myanmar og tilgrænsende egne. Den bliver 13-24 cm og er den mest vandelskende af de krokodillesalamandre, der holdes i terrarier: i den varme tid af året bliver den ofte helt i vandet, hvor den er aktiv og nysgerrig.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Pleurodeles verrucosus; Triturus verrucosus* Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-24 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**12-18 g**
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Bjergskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**12-36 mdr.**
Æg pr. sæson	**30-200**
Klækning	**10-12 dage** ved 25 °C
Larvetid	**90-150 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 12-15 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Hele slægten Tylototriton står på CITES liste II og i EU's bilag B. Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Arten står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; Fødevarestyrelsen kan oplyse om de aktuelle regler ved import og handel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Tylototriton verrucosus* holdes bedst i et akvaterrarie. Over omkring 18 °C kan den mørke form holdes helt i vand. Et akvarium på 60 × 30 × 35 cm passer til to par af den mørke form og til færre dyr af de større former.
TEMPERATUR	Om sommeren holdes dyrene ved omkring 25 °C og om vinteren ved 15-18 °C; boksens dagtemperatur er 18-25 °C og nattemperaturen 15-20 °C. Den mørke form tåler i nogle dage både højere og lavere temperaturer uden skade.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden er ikke afgørende i en vandrig opstilling; 70-90 % er et skøn. Hvor der er land, holdes landdelen fugtig, men ikke mudret. Sørg for, at luften ikke står stille.
VAND OG VANDKVALITET	Vanddybden er 12-15 cm. Skift 20-30 % af vandet hver anden uge, og oftere, hvis der er mange foderrester. Postevand behandles med vandbehandler mod klor, kloramin og tungmetaller, før det bruges.
LYS OG UVB	Arten er skumrings- og nataktiv, og UVB er ikke nødvendigt. En dagslængde på omkring 12 timer om sommeren er en god, men ikke nødvendig rytme, og lyset skal ellers bare passe til planterne. Undgå direkte sol.
FODER	Arten er ikke kræsen, og store hunner kan æde forbløffende meget på kort tid.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	I vandet er dyret aktivt og nysgerrigt og kan blive ret tamt: det svømmer hen til ruden for at få mad og tager foder fra pincet og fingre. Det egner sig dog ikke til daglig håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina, Myanmar (Burma), Indien og Thailand.