herpy

SALAMANDRE

Vietnam Crocodile Newt

Tylototriton vietnamensis

Tylototriton vietnamensis er en lille, mørk krokodillesalamander på 12-17 cm fra nogle få skovrester i det nordlige Vietnam. Dyret er sort til brungråt, med klart gule til orangerøde fingre, tæer og halebund, og lever mest på land. Arten blev først beskrevet i 2005 og er sårbar i naturen.

Familie: Salamandridae Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-17 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**7-18 g**
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**18 mdr.**
Æg pr. sæson	**5-178**
Lægninger pr. år	**1-2**
Klækning	**28 dage** ved 22-24 °C
Larvetid	**60-180 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-25 °C**
Temperatur, nat	**23-25 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vanddel** dybde 1-5 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Tylototriton står på CITES liste II og i EU's bilag B. Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Arten står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen ved import eller handel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Tylototriton vietnamensis* holdes i et regnskovsterrarie med en vanddel. Pladsbehovet regnes ud fra dyrenes længde: for to dyr på 15 cm skal bundarealet være omkring 0,15 m² (50 × 30 cm), og for hvert ekstra dyr lægges 25 % til.
TEMPERATUR	Fra marts til oktober holdes terrariet ved 23-25 °C. En særskilt nattemperatur er ikke dokumenteret, så boksen viser samme interval døgnet rundt. Korte toppe over 30 °C tåles, men der skal altid være køligere steder i terrariet.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden er 70-100 % i den varme del af året. Terrariet sprøjtes dagligt med en blomstersprøjte eller et regnanlæg; mængden afhænger af terrariets størrelse og ventilation.
VAND OG VANDKVALITET	Vanddelen er 1-5 cm dyb og fylder en fjerdedel af bundarealet. Vandet er blødt og svagt surt (pH 6,4-6,8) som i naturen. Giv altid et let udgangssted med sten, grus eller en flad bred.
LYS OG UVB	Lyset har ingen særlig betydning for dyrene, og de er ikke glade for kraftigt lys. Belysningen kan rettes efter planterne, med LED-lister eller lysstofrør, eller bare det lys, der falder ind i rummet. UVB er ikke nødvendigt.
FODER	Voksne dyr får regnorme, fårekyllinger og voksorme, og foderdyrene fodres selv med en varieret kost og drysses med vitamin- og mineraltilskud.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyrene søger skjul og er ikke glade for skarpt lys. Hannerne går ned i vandet i yngletiden, bliver lysere og får en tydeligt anderledes hud, og de venter på hunnerne. Resten af året lever begge køn på land.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Vietnam.