herpy

SALAMANDRE

Wenxian Knobby Newt

Tylototriton wenxianensis

Tylototriton wenxianensis er en mellemstor, næsten helt sort krokodillesalamander med orange tåspidser og halekant. Den lever skjult i skov og krat i bjergene i det centrale Kina og går kun i vandet for at yngle; æggene lægges på land. Der findes kun lidt viden om pasningen, så vejledningen bygger på nære slægtninge.

Familie: Salamandridae Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Bjergskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vanddel** dybde 3-5 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**På jorden**
Æg pr. sæson	**30-80**
Klækning	**20-36 dage** ved 22-24 °C
Larvetid	**80-130 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Tylototriton står på CITES liste II og i EU's bilag B. Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Arten står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; Fødevarestyrelsen kan oplyse om de aktuelle regler ved import og handel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Tylototriton wenxianensis*.
TEMPERATUR	Om sommeren holdes terrariet på 22-24 °C, om vinteren omkring 18 °C, og kortvarigt lavere temperaturer skader ikke; sådan holdes *T. ziegleri*.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Om sommeren sprøjtes terrariet dagligt, så mos og bund holdes fugtige; 70-90 % luftfugtighed er et skøn. Om vinteren holdes terrariet tørrere: der sprøjtes kun lidt og kun enkelte steder, fx på mospuderne, og vandstanden sænkes.
VAND OG VANDKVALITET	Vandet er blødt og let surt, pH 6,4-6,8, og højst omkring 5 cm dybt. Uden for yngletiden bruger dyrene næsten ikke vanddelen; om vinteren kan den næsten tørlægges, så der kun er en smule vand tilbage til fugten.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendigt. Arten lever skjult og bryder sig ikke om stærkt lys; lyset er først og fremmest til planterne. Giv omkring 12 timers lys om sommeren og 10-11 timer om vinteren.
FODER	Føden er ikke dokumenteret for arten. Slægten tager almindeligt salamanderfoder: regnorme, fårekyllinger, bænkebidere og voksmøllarver.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Adfærden i fangenskab er ikke dokumenteret for arten. Hos *T. ziegleri* lever dyrene meget skjult, og de kan holdes alene, i par eller i små grupper. Hold arten for sig selv uden andre padder.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina.