herpy

SKILDPADDER

Red-Footed Tortoise

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis carbonarius er en mellemstor, mørk landskildpadde fra Sydamerikas savanner og skovbryn med røde til orange skæl på hoved og ben. Skjoldet bliver typisk 30-35 cm langt, dyret lever i mindst 50 år og er en af de mest holdte tropiske landskildpadder. Den skal have høj luftfugtighed og varme hele året og æder både planter, frugt og lidt animalsk føde.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Chelonoidis carbonaria; Geochelone carbonaria; Testudo carbonaria* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-45 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**50-70 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Savanne, tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**280 × 140 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-7 æg**
Inkubation	**105-200 dage** ved 28-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr (som alle landskildpadder, Testudinidae spp.). Køb og salg kræver derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES- og EU-papirer. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Chelonoidis carbonarius er en aktiv skildpadde, der bruger al den plads, den får. Den lever på jorden, så gulvareal er vigtigere end højde. I Danmark er det indendørs terrarie dyrets egentlige hjem det meste af året.

TEMPERATUR
Indendørs skal der være en gradient. Lufttemperaturen er 24-29 °C om dagen, og solpladsen under varmelampen er 32-35 °C, målt på selve underlaget.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten kommer fra et varmt og fugtigt klima og skal have høj luftfugtighed: 70-90 %, med korte spidser op mod 100 %.

LYS OG UVB
C. carbonarius er dagaktiv og skal have UVB, når den ikke er i direkte sol. Mål UV-indekset 2,0-3,0 på solpladsen (Ferguson-zone 2).

FODER
C. carbonarius er altæder og æder i naturen planter, blomster, frugt, svampe og lidt animalsk føde. I fangenskab fungerer en fordeling på omkring 90 % plantemateriale og 10 % animalsk føde.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er nysgerrig, aktiv og forholdsvis rolig. Den lærer sin holder at kende, kommer gerne til, når der er mad, og tager mad fra en hånd eller en pincet.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Panama, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasilien, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina og Trinidad og Tobago.