herpy

SKILDPADDER

Yellow-Footed Tortoise

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis denticulatus er en stor, mørk skovskildpadde fra Amazonas og de tilstødende skove med gule til orange skæl på hoved og ben. Skjoldet er typisk 35-45 cm langt, og i nogle bestande bliver dyrene 60-70 cm. Arten kan leve i mere end 50 år, kræver jævn varme og høj luftfugtighed hele året og æder blade, frugt og lidt animalsk føde.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Chelonoidis denticulata; Geochelone denticulata; Testudo denticulata; Testudo tabulata* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**35-70 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**50-60 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**320 × 160 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-29 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**96-120 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-7 æg**
Inkubation	**120-190 dage** ved 29-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr (som alle landskildpadder, Testudinidae spp.). Køb og salg kræver derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES- og EU-papirer. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Chelonoidis denticulatus passes i store træk som den nære slægtning *Chelonoidis carbonarius*, men er en mere udpræget skovart, der kræver mere skygge, mere stabil varme og en jævnt høj luftfugtighed.

TEMPERATUR
Lufttemperaturen er 26-29 °C om dagen, og solpladsen under varmelampen er 29-32 °C, målt på selve underlaget. Den køligere ende er 24-26 °C. Om natten må temperaturen falde til 20-23 °C, men aldrig under 18 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden er ikke målt for arten; 70-90 % er lånt fra *C. carbonarius* og passer til en fugtig skovart. Substratet skal være jævnt fugtigt uden at stå i vand.

LYS OG UVB
C. denticulatus er dagaktiv, men en skyggeelskende skovart, der ikke soler sig i skarpt lys som ørkenarter. UVB er alligevel nødvendig: mål UV-indekset 2,0-3,0 på solpladsen (Ferguson-zone 2).

FODER
C. denticulatus er altæder. I naturen æder den blade, græs, blomster, nedfaldne frugter, svampe, ådsler og langsomme smådyr. Frugt fylder lidt mere i kosten end hos *C. carbonarius*, men basis er stadig blade.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er rolig og nysgerrig, men ofte lidt mere tilbageholdende end *C. carbonarius*, og den opholder sig helst tæt på dækning. Mange dyr bliver dog tillidsfulde og kommer frem, når der er mad.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasilien, Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia og Trinidad og Tobago.