herpy

SKILDPADDER

South African Bowsprit Tortoise

Chersina angulata

Chersina angulata er en mellemstor, kuplet landskildpadde fra Sydafrikas kyst- og buskområder. Arten kendes på det store, fremskudte skjold under hagen (gularskjoldet), som hannerne bruger til at vælte rivaler. Skjoldlængden er typisk 17-19 cm. Den er hårdfør i sit eget middelhavsagtige klima, men tåler kulde og fugt dårligt og kræver meget plads, sol og tør, sandet bund.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Testudo angulata; Testudo bellii; Goniochersus angulatus; Neotestudo angulata; Chersine angulata*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**30-50 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**160 × 80 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**12-18 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**120-144 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**1-6**
Inkubation	**94-198 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr (som alle landskildpadder, Testudinidae spp.). Køb og salg kræver derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES- og EU-papirer. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt udgivet viden om pasningen af *Chersina angulata* uden for Sydafrika.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 22-28 °C i terrariet og under en lampe en solplads på 32-35 °C, målt på underlaget. Tallene er skønnet ud fra levestedets klima og lånt fra *T. hermanni*. Om natten er 12-18 °C passende.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*C. angulata* hører til tørre til halvtørre levesteder og skal have en luftfugtighed på 40-60 %; tallet er et skøn ud fra levestedet. Hold størstedelen af bunden tør og lav et lidt fugtigere hjørne under et skjul.
LYS OG UVB	*C. angulata* er dagaktiv og soler sig meget. Sollys er det bedste, og dyret skal ud i solen, så ofte vejret tillader det. Indendørs skal der være UVB-lys med UV-indeks 2,0-3,0 på solpladsen (Ferguson-zone 3).
FODER	I naturen er urter og græsser den vigtigste føde, og dyret æder desuden mos, svampe, insekter, sneglehuse og efterladenskaber. Det vælger selektivt og skifter føde med årstiden.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky og trækker sig ind under buske eller graver sig halvt ned. Hannerne er indbyrdes aggressive, især om foråret: de vælter hinanden med gularskjoldet, og den svageste kan blive hjælpeløs på ryggen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Sydafrika og Namibia.