herpy

SKILDPADDER

Painted Turtle

Chrysemys picta

Chrysemys picta er en dagaktiv, halvt vandlevende skildpadde fra Nordamerika med røde og gule striber på hals, ben og skjoldkant. Skjoldet bliver 13-25 cm, og dyret kan leve i mange årtier. Et voksent dyr kræver et stort, filtreret kar med flere hundrede liter vand, en varm solplads og kraftig UVB.

Familie: Emydidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-25 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**300-500 g**
Levetid	**25-40 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**170 × 70 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-30 °C**
Hotspot	**30-40 °C**
Temperatur, nat	**15-24 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 25-35 cm
Vandtemperatur	**21-27 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, færdigfoder, planter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-15 æg**
Kuld pr. år	**1-5**
Inkubation	**72-80 dage** ved 25-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

EU-bilag B (kun levende dyr) efter forordning (EU) 2026/1383; ikke på CITES-listerne. Bilaget er aflæst i én gengivelse af forordningen og ikke krydstjekket, så det er sandsynligt, men ikke bekræftet. Ikke på EU's liste over invasive arter af unionsbetydning. Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) om kravene til dokumentation ved køb og salg.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Hold dyret i et akvarium, et stort kar eller en lukket indendørs dam, ikke i et almindeligt terrarie.
TEMPERATUR	Solpladsens overflade skal være omkring 40 °C, målt med et infrarødt termometer et par timer efter, at lamperne er tændt, og luften over solpladsen 30-35 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Skildpaddens fugtighed er vandet selv, så luftens relative fugtighed er ikke nærmere dokumenteret for arten og er ikke afgørende; 50-80 % i rummet er rigeligt. Det afgørende er vandets renhed.
VAND OG VANDKVALITET	Vandet er dyrets opholdssted, så det skal være dybt, rent og varmt. Vanddybden skal mindst svare til skjoldlængden, og 25-35 cm passer til voksne dyr. Temperaturen er 24-27 °C (se Temperatur).
LYS OG UVB	UVB er en nødvendighed. Arten hører til Ferguson-zone 3-4. UV-indekset på solpladsens overflade skal være omkring 3,0-4,0, og der må gerne være områder med lavere UV-indeks, så dyret kan vælge.
FODER	*C. picta* er altædende. I naturen æder den vandplanter, alger, vandinsekter, krebsdyr, snegle, små fisk og ådsler. De unge dyr er mest kødædende, og med alderen bliver kosten mere plantebaseret.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*C. picta* er dagaktiv, sky og hurtig til at flygte ned i vandet. Den er ikke tæmmet og trives ikke med kontakt, så den skal kun håndteres, når det er nødvendigt, fx ved sundhedstjek eller rengøring.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Canada, USA og Mexico.