herpy

SKILDPADDER

Asian Leaf Turtle

Cyclemys dentata

En mørkebrun, bladformet skildpadde fra skovbække og fugtig skov i Sydøstasien. Skjoldet er lavt hvælvet og savtakket bagtil, og hoved og hals har røde til orange striber. Voksne dyr går mest på land, mens ungerne lever i vandet. Arten kræver et stort, fugtigt akvaterrarie og rent vand, og den er sky.

Familie: Geoemydidae Tidligere navn: *Cyclemys dhor; Cyclemys orbiculata; Cyclemys ovata*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**130 × 65 × 75 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 15-20 cm
Vandtemperatur	**22-26 °C**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt, færdigfoder, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**84-120 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-4 æg**
Kuld pr. år	**1-5**
Inkubation	**90-110 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

CITES liste II og EU-bilag B (forordning (EU) 2026/1383, gælder hele slægten Cyclemys). CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Spørg SGAV om kravene til dokumentation ved køb, salg og import. Arten står ikke på de danske forbudslister for skildpadder (kun havskildpadder er forbudt).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt pasningsviden om *Cyclemys dentata*, og den bygger på erfaringer fra hobbyen, ikke på undersøgelser. Indretningen bygger derfor også på artens levested i skovbække.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 24-27 °C i luften, og solpladsen skal være 30-32 °C. Om natten er 22-25 °C passende. Vandet holdes på 22-26 °C; tallet er et skøn ud fra lufttemperaturen. Mål solpladsens overflade med et digitalt termometer.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være 70-90 %, helst omkring 80 % om dagen og højere om natten. Den holdes oppe med forstøvning to gange om dagen, et tykt, fugtigt bundlag med løv og fugtige skjul fyldt med sphagnum i den kølige ende.

LYS OG UVB
Arten er et skovdyr og skal have svagt UVB med skygge til resten. Brug et T5-UVB-rør til skyggedyr (Ferguson-zone 1), fx 5-6 %, i en reflekterende armatur over landpartiet og solpladsen.

FODER
Arten er altædende og spiser både dyr og planter. Unger fodres hver eller hver anden dag, voksne dyr 2-3 gange om ugen efter huld. Giv ikke mere, end dyret spiser op, så det ikke bliver overvægtigt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Cyclemys dentata er sky og gemmer sig meget, og arten egner sig ikke til håndtering. Vil du have kontakt, så fodr med en pincet. Hold dyrene enkeltvis, og giv rigeligt med skjul og planter for at undgå stress.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Bangladesh, Myanmar (Burma), Thailand, Cambodja, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesien, Brunei og Filippinerne.