herpy

SKILDPADDER

Gopher Tortoise

Gopherus polyphemus

Gopherus polyphemus er en stor, mørk landskildpadde fra sandede, tørre skovområder i det sydøstlige USA. Den graver op til 12 m lange huler, som flere hundrede andre dyrearter bruger som skjul. Skjoldlængden er 23-30 cm. Arten kræver en stor udendørs indhegning med dyb, tør sandjord, rigeligt græs og en kunstig hule.

Familie: Testudinidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**23-30 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**2.000-6.000 g**
Levetid	**60-100 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**200 × 100 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Hotspot	**32-36 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**108-240 mdr.**
Kuldstørrelse	**3-15 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**60-90 dage** ved 30-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr (som alle landskildpadder, Testudinidae spp.). Køb og salg kræver derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES- og EU-papirer. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt udgivet viden om pasningen af *Gopherus polyphemus*. Pasningen bygger på levestedet og på den nært beslægtede *Gopherus agassizii*, som har samme gravende levevis.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 24-30 °C, med en solplads under en varmelampe på 32-36 °C, målt på underlaget. Om natten er 18-22 °C passende, og varmen slukkes.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten har brug for en luftfugtighed på 40-70 %, og i hulen kan den være op til 80 %. Hold overfladen tør, men gør hulen fugtigere ved at lægge fugtig jord og blade i bunden.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig meget. Sollys er det bedste, og dyret skal ud i solen, så ofte vejret tillader det. Indendørs skal der være UVB-lys med UV-indeks 2,0-3,0 på solpladsen (Ferguson-zone 3).
FODER	*G. polyphemus* er en græsæder, og græs udgør omkring 80 % af kosten.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret er solitært og bruger det meste af tiden på at grave, æde og sole sig. I naturen lever dyrene i kolonier med tæt liggende huler, og nogle hunner besøger gentagne gange den samme hunnes hule.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA.