herpy

SKILDPADDER

Forsten's Tortoise

Indotestudo forstenii

Indotestudo forstenii er en mellemstor landskildpadde fra skovene på Sulawesi og Halmahera i Indonesien. Rygskjoldet er karamelfarvet til mørkebrunt med sorte pletter, og voksne dyr bliver typisk omkring 25 cm. Arten er skumringsaktiv og genert, kræver varme og høj luftfugtighed og går ikke i vinterhvile. Den er kritisk truet, og dyr fra naturen er ofte syge.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Testudo forstenii; Geochelone forsteni; Indotestudo elongata forsteni*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-30 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**2.000-3.000 g**
Levetid	**30-50 år**
Aktiv	**Skumring**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 120 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**18-20 °C**
Luftfugtighed	**70-85 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-4 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**130-165 dage** ved 26-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr (som alle landskildpadder, Testudinidae spp.). Køb og salg kræver derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES- og EU-papirer. Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) om kravene. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Indotestudo forstenii*, og meget er lånt fra den nære *Indotestudo elongata*. Arten skal have et stort, åbent gulvareal med fugtigt underlag og skjul.

TEMPERATUR
Luften skal være 26-30 °C om dagen og 18-20 °C om natten. Dyrene søger ikke sol og sidder sjældent under lampen, men en varmezone på 30-32 °C under en varmelampe i den ene ende, målt i skjoldets højde, giver dem et valg.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være høj, omkring 70-85 %, med en fugtigere og en tørrere zone, så dyret selv kan vælge. Underlaget skal være fugtigt, men ikke vådt, og skjulene fugtes jævnligt.

LYS OG UVB
Indotestudo forstenii undgår kraftigt lys, men har brug for D3-vitamin til kalkomsætningen. Den bedste løsning er udendørsophold i halvskygge; glas og plexiglas stopper UVB.

FODER
Indotestudo forstenii er altædende med planter som hovedbestanddel. Basis er blade og urter som romersalat, endivie, mælkebøtte og vejbred sammen med revne grøntsager.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Indotestudo forstenii er generet og mest aktiv ved daggry og skumring. Den skal have flere skjul og må ikke forstyrres hele tiden. Løft den kun, når det er nødvendigt, under bugskjoldet med begge hænder.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indonesien.