herpy

SKILDPADDER

Bell's Hinge-back Tortoise

Kinixys belliana

Kinixys belliana er en mellemstor afrikansk landskildpadde med et aflangt skjold og et bevægeligt hængsel bagtil, som kan lukke skjoldet over bagben og hale. Skjoldet er 15-22 cm langt. Arten lever i savanne med tydelig regntid og tørtid, kræver stabil varme og en vis fugtighed og stresser let. Nyindførte dyr bærer ofte mange parasitter.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Cinixys belliana; Kinixys schoensis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-22 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**30-50 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**160 × 80 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-32 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-6 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**105-200 dage** ved 28-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr (som alle landskildpadder, Testudinidae spp.). Køb og salg kræver derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES- og EU-papirer. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt sikker viden om pasningen af *Kinixys belliana*, fordi meget af den ældre viden stammer fra tiden, hvor flere arter blev regnet som én.
TEMPERATUR	Dyret skal holdes varmt, over 29 °C det meste af tiden. Dagtemperaturen er 28-32 °C, og solpladsen er 32-35 °C, målt på underlaget. Nattemperaturen er ikke dokumenteret for arten; 22-24 °C passer til et tropisk klima.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Som savanneart er *K. belliana* mindre fugtkrævende end skovarterne *Kinixys homeana* og *Kinixys erosa*, men den holder af fugt og skal sprøjtes jævnligt.
LYS OG UVB	*K. belliana* er dagaktiv, men mest fremme tidligt og sent på dagen, når lyset er svagt. Sollys er det bedste, men i Danmark er UVB-lys nødvendigt: UV-indeks 2,0-3,0 på solpladsen (Ferguson-zone 2).
FODER	*K. belliana* er altæder, og unger er næsten udelukkende kødædere.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky og trækker sig ind i skjoldet eller graver sig ned, når den bliver forstyrret. Den er mest aktiv tidligt om morgenen og sent på dagen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Angola, Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Congo-Kinshasa, Eritrea, Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Sydsudan, Sudan, Uganda, Tanzania og Malawi.