herpy

SKILDPADDER

Home's Hinge-back Tortoise

Kinixys homeana

Kinixys homeana er en lille vestafrikansk landskildpadde med et lavt, kantet skjold og et bevægeligt hængsel bagtil, som kan lukke skjoldet over bagben og hale. Skjoldet er godt 20 cm langt. Arten lever i fugtig skov og sumpet område, er mest aktiv i skumringen og stresser let. Den er kritisk truet i naturen, og der findes kun lidt sikker viden om pasningen.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Cinixys homeana; Kinixys belliana homeana*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-22 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**30-50 år**
Aktiv	**Skumring**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**160 × 80 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-7 æg**
Inkubation	**110-115 dage** ved 28-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks I**
EU-bilag	**Bilag A**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

CITES liste I og EU-bilag A: arten blev flyttet fra liste II til liste I ved CITES' partskonference (i kraft 5.3.2026). Køb, salg og udstilling kræver som udgangspunkt et EU-certifikat (forordning 338/97 art. 8 og 10), som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Kontakt SGAV, før et dyr købes, sælges eller flyttes. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt sikker viden om pasningen af *Kinixys homeana*.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 28-30 °C i det meste af terrariet, og om natten 22-24 °C. Nattemperaturen er ikke dokumenteret for arten, men passer til et tropisk lavlandsklima.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Som skovart er *Kinixys homeana* mere fugtkrævende end savannearter som *Kinixys belliana*. Luftfugtigheden skal være 70-90 %, og nyindførte eller udtørrede dyr skal have over 85 %.
LYS OG UVB	*K. homeana* er mest aktiv i skumringen og stresser i skarpt lys. Belysningen skal være dæmpet, med planter og skjul, hvor dyret kan trække sig ud af lyset.
FODER	*K. homeana* er altæder, og unger er næsten udelukkende kødædere. Kosten er cirka halvt plantemateriale og halvt animalsk føde.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky og trækker sig ind i skjoldet eller graver sig ned, når den bliver forstyrret. Den er mest aktiv tidligt om morgenen og sent på dagen og tilbringer meget tid nedgravet i fugtig bund.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Liberia, Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Ækvatorialguinea, Den Centralafrikanske Republik og Sydsudan.