herpy

SKILDPADDER

## Eastern Mud Turtle

# *Kinosternon subrubrum*

*Kinosternon subrubrum* er en lille, mørk sumpskildpadde fra det sydøstlige USA. Skjoldet bliver 8-12 cm, og arten går mest langs bunden af lavt, plantebevokset vand. Den har to bevægelige hængsler på bugskjoldet, så den kan lukke sig næsten helt inde, og den kan leve 20-50 år. Arten er sky og mest aktiv i skumringen og skal have et filtreret kar med lavt vand, varmelampe og UVB.

Familie: Kinosternidae  Tidligere navn: *Kinosternon pensylvanicum*

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **8-12 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Vægt | **90-260 g** |
| Levetid | **20-50 år** |
| Aktiv | **Skumring** |
| Levevis | **Gravende og semi-akvatisk** |
| Biotop | **Vådområde og tempereret skov og eng** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **80 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **24-29 °C** |
| Hotspot | **30-33 °C** |
| Temperatur, nat | **20-24 °C** |
| Luftfugtighed | **40-60 %** |
| Vand | **Akvaterrarie**<br>dybde 15-20 cm |
| Vandtemperatur | **21-24 °C** |
| UVB | **Anbefalet**<br>Ferguson-zone 2 |
| Kost | **Insekter, færdigfoder, planter, hvirveldyr og orme/snegle** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **36-96 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **2-5 æg** |
| Kuld pr. år | **1-3** |
| Inkubation | **75-125 dage**<br>ved 26-29 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| EU-bilag | **Bilag B** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

CITES liste II og EU-bilag B (forordning (EU) 2026/1383) via slægtslistningen *Kinosternon* spp. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Spørg SGAV om kravene til dokumentation ved køb, salg og import.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | *Kinosternon subrubrum* holdes i et akvarium eller et lavt kar med landdel, ikke i et almindeligt terrarie. |
| **TEMPERATUR** | Vandet skal være 21-24 °C, og en vandvarmer med skærm er normalt nødvendig. Solpladsen skal være 30-33 °C målt på overfladen, og luften i karret 24-29 °C om dagen. Om natten må temperaturen falde til 20-24 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden betyder lidt for en vandskildpadde; 40-60 % i rummet er passende. Luften over karret må ikke være kold eller trækfuld, for det øger risikoen for luftvejsinfektioner. Vandet skal være klart og rent. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | Vandet er 15-20 cm dybt for voksne dyr, med flade og lavere partier, hvor dyret kan hvile og række halsen op til overfladen. Arten er en svag svømmer, så dybt vand giver stress. Temperaturen er 21-24 °C (se Temperatur). |
| **LYS OG UVB** | UVB er anbefalet, så dyret kan danne D3-vitamin og optage kalk, og solpladsen skal have både varmelampe og UVB-rør, selv om arten kun soler sig sjældent. Zone 2 passer, fordi arten er skumringsaktiv og ikke soler sig meget. |
| **FODER** | *Kinosternon subrubrum* er altædende, men overvejende kødædende. I naturen æder den snegle, muslinger, orme, insekter, edderkopper, krebsdyr, haletudser, ådsler, alger, vandplanter og frø. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Kinosternon subrubrum* er sky og aktiv, især i skumringen, og den ses mest, når den undersøger bunden. Den er ikke et dyr til at tage op: den kan bide hårdt med hornnæbbet og afgive en ildelugtende væske. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | USA. |