herpy

SKILDPADDER

African Pancake Tortoise

Malacochersus tornieri

Malacochersus tornieri er en lille østafrikansk landskildpadde med et usædvanligt fladt, tyndt og bøjeligt skjold. Den lever på klippefyldte bakker i tør savanne og krat, hvor den flygter ind i smalle klippespalter i stedet for at trække sig ind i skjoldet. Skjoldet er 15-18 cm langt, hunnen lægger kun ét æg ad gangen, og arten er kritisk truet i naturen.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Testudo tornieri; Testudo loveridgii*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-18 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Halvørken, savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 60 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Kuld pr. år	**1-4**
Inkubation	**120-185 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks I**
EU-bilag	**Bilag A**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Arten står på CITES liste I og i EU-bilag A. Køb, salg, udbud til salg og kommerciel udstilling kræver derfor som udgangspunkt et EU-certifikat for det enkelte dyr (forordning 338/97, art. 8 og 10). Certifikaterne udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg styrelsen, før du køber, sælger eller udstiller, og sørg for, at certifikatet følger dyret. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt udførlig viden om pasningen af *Malacochersus tornieri*, og vildfangne dyr er meget vanskelige at vænne til fangenskab.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 24-28 °C, og om natten 18-22 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være lav, 30-50 %. Terrariet skal være tørt, men en lille skål med rent drikkevand skal altid være fremme. Skift vandet dagligt.
LYS OG UVB	*Malacochersus tornieri* er dagaktiv og er mest ude tidligt og sent på dagen. UVB er nødvendigt, når dyret holdes indendørs: Ferguson-zone 2, svarende til UV-indeks 2,0-3,0 i en del af terrariet.
FODER	Kosten er tør og fiberrig. Giv tørre græsser, hø og vilde urter som mælkebøtte, kløver og vikke, og lad sukkulenter som aloe og stenurt indgå. Mørkegrønne salatblade kan bruges, og frugt er kun en sjælden godbid i små mængder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Malacochersus tornieri* er sky, men aktiv og vedholdende. Den klatrer, gemmer sig og kommer kun frem, når der er ro. Den trækker sig ikke ind i skjoldet, men løber mod nærmeste spalte og trykker sig ind, når den bliver forstyrret.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kenya, Tanzania og Zambia.