herpy

SKILDPADDER

Balkan Terrapin

Mauremys rivulata

Mauremys rivulata er en mellemstor, dagaktiv ferskvandsskildpadde fra Balkan og det østlige Middelhavsområde. Hunnerne når omkring 24 cm skjoldlængde, hannerne omkring 19 cm. Arten er hårdfør og tåler mange slags vand, men kræver et stort, filtreret akvaterrarie med en varm solplads og UVB. Om sommeren kan den holdes udendørs i en lukket dam.

Familie: Geoemydidae Tidligere navn: *Mauremys caspica rivulata; Emys rivulata* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-24 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**170 × 70 × 65 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**30-35 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 25-40 cm
Vandtemperatur	**21-27 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, færdigfoder, planter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-10 æg**
Kuld pr. år	**2-3**
Inkubation	**49-77 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Ikke på CITES-listerne og ikke i EU's bilag A-D (kontrolleret mod slægts- og familielistninger).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Hold dyret i et stort akvaterrarie, et kar eller en lukket dam, ikke i et almindeligt terrarie.
TEMPERATUR	Vandet skal være 21-27 °C. Luften over vandet skal være 24-29 °C, og overfladen på solpladsen skal nå 30-35 °C, målt med et infrarødt termometer. Om natten kan temperaturen falde omkring 3 °C, og om vinteren lidt mere.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Skildpaddens fugtighed er vandet selv. Luftens relative fugtighed er ikke dokumenteret for arten, og 50-70 % i rummet er et skøn.
VAND OG VANDKVALITET	Vandet er dyrets opholdssted, så det skal være dybt, rent og varmt. Vanddybden skal mindst svare til skjoldlængden, og 25-40 cm passer til voksne dyr; unger skal have lavere vand. Temperaturen er 21-27 °C (se Temperatur).
LYS OG UVB	UVB er en nødvendighed: det gør det muligt for dyret at danne D3-vitamin, optage kalk og få et sundt skjold. Ferguson-zonen er ikke dokumenteret for arten; zone 3 er et skøn ud fra, at arten soler sig meget.
FODER	*Mauremys rivulata* er altædende. I naturen er unge dyr overvejende kødædere, mens voksne i højere grad æder planter. Føden omfatter vandplanter, trådalger, insektlarver, orme, snegle, krebsdyr, haletudser og små fisk samt ådsler.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Mauremys rivulata* er dagaktiv og sky: den dykker lynhurtigt, når den forstyrres. Slægten er intelligent og lærer at forbinde dig med mad. Dyret bryder sig ikke om at blive håndteret.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Albanien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Grækenland, Israel, De palæstinensiske områder, Jordan, Libanon, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien, Syrien og Tyrkiet.