herpy

SKILDPADDER

West African Mud Turtle

Pelusios castaneus

Pelusios castaneus er en mellemstor skildpadde fra det vestlige og centrale Afrika. Skjoldet bliver 18-28 cm, og arten kan blive 30-50 år. Den er hårdfør, aktiv og grådig og kræver et stort, filtreret kar med varmt vand, en varm solplads og UVB. Dyrene trækker hovedet ind til siden under skjoldranden, og hannerne jager hunnerne hårdt.

Familie: Pelomedusidae Tidligere navn: *Emys castanea; Pelusios derbianus; Pelusios seychellensis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-28 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**30-50 år**
Aktiv	**Dag og nat**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Savanne, regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 75 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**32-36 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 15-25 cm
Vandtemperatur	**24-27 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, færdigfoder, planter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**11-27 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**53-75 dage** ved 27-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Ikke på CITES-listerne og ikke i EU's bilag A-D (kontrolleret mod slægts- og familielistninger).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Hold dyret i et stort akvarium eller et kar, ikke i et almindeligt terrarie. Karret skal være mindst fem gange så langt som skjoldet og halvt så bredt, som det er langt, og landdelen regnes med i bundarealet.

TEMPERATUR
Vandet skal være 24-27 °C. Varmere vand gør dyret uroligt, og i køligere vand mister det appetitten og søger efter varme. En vandvarmer bag en plastskærm er normalt nødvendig, medmindre rummet er varmt nok.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden betyder lidt for en vandskildpadde; 50-80 % i rummet er passende. Luften over karret skal være varm og uden træk, for kold og fugtig luft øger risikoen for luftvejsinfektioner.

VAND OG VANDKVALITET
Vandet skal holdes rent, fordi arten ikke skifter skjoldpladerne, så snavs bliver siddende på skjoldet. Vanddybden er 15-25 cm for voksne dyr, gerne gradvist skrånende, og omkring 10 cm for unger.

LYS OG UVB
UVB er nødvendigt for D3-vitamin og kalkoptagelse, og det hæmmer desuden bakterier på skjoldet. Voksne dyr soler sig meget, så der skal være en tør, varm solplads med en kraftig lampe, og unger skal også have solplads.

FODER
Pelusios castaneus er altædende, men hælder kraftigt mod kød. I naturen æder den krebsdyr, insekter, fisk, rejer, krabber og store snegle samt lidt vegetation som vandsalat og frø.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Pelusios castaneus er rolig, nysgerrig og aktiv. Dyrene trækker sig som regel ind, når de håndteres, bider sjældent, men kan kradse med de skarpe kløer for at komme fri.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Ækvatorialguinea, Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola, Den Centralafrikanske Republik og São Tomé og Príncipe.