herpy

SKILDPADDER

River Cooter

Pseudemys concinna

Pseudemys concinna er en stor, dagaktiv ferskvandsskildpadde fra floder og søer i det østlige og centrale USA, med et fladt skjold prydet af gule hvirvler. Skjoldet kan nå over 40 cm, og dyret kan leve i flere årtier. Et voksent dyr kræver et meget stort, filtreret kar med flere hundrede liter vand, en varm solplads, kraftig UVB og en overvejende plantebaseret kost.

Familie: Emydidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**22-44 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-44 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**200 × 80 × 70 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-31 °C**
Hotspot	**30-40 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 30-45 cm
Vandtemperatur	**21-31 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, færdigfoder, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**10-20 æg**
Kuld pr. år	**1-6**
Inkubation	**80-150 dage** ved 26-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke på CITES-listerne og ikke i EU-bilag A-D (kontrolleret mod slægts- og familielistninger). Ikke på EU's liste over invasive arter af unionsbetydning; den eneste skildpadde på listen er *Trachemys scripta*.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Hold dyret i et stort akvarium, et kar eller en lukket indendørs dam, ikke i et almindeligt terrarie.
TEMPERATUR	Solpladsens overflade skal være omkring 40 °C, målt med et infrarødt termometer et par timer efter, at lamperne er tændt, og luften over den 30-32 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Skildpaddens fugtighed er vandet selv, så luftens relative fugtighed er ikke nærmere dokumenteret for arten og ikke afgørende; 50-80 % i rummet er rigeligt. Det afgørende er vandets renhed.
VAND OG VANDKVALITET	Vandet er dyrets opholdssted, så det skal være dybt, rent og varmt. Vanddybden skal mindst svare til skjoldlængden, og 30-45 cm passer til voksne dyr. Temperaturen er 21-31 °C for voksne dyr (se Temperatur).
LYS OG UVB	UVB er en nødvendighed. Arten er dagaktiv, soler sig meget og hører til Ferguson-zone 3. UV-indekset på solpladsens overflade skal være 3,0-4,0 og lavere andre steder i opstillingen, så dyret kan vælge.
FODER	*P. concinna* æder i naturen mest vandplanter, græs og alger og tager også planter ved vandkanten og nedfaldne frugter; den har tandlignende spidser i overkæben, der hjælper med at rive fibrøse blade over.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*P. concinna* er dagaktiv og meget sky: ved den mindste bevægelse eller lyd glider den fra solpladsen i vandet. Den bryder sig ikke om at blive håndteret og skal kun løftes, når det er nødvendigt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA.