herpy

SKILDPADDER

Florida Red-bellied Cooter

Pseudemys nelsoni

Pseudemys nelsoni er en stor, dagaktiv ferskvandsskildpadde fra stille søer, damme og moser med tæt plantevækst i Florida og det yderste sydøstlige Georgia. Skjoldet er højt og mørkt med røde striber, og bugskjoldet er gulorange til rødligt. Hunnen kan nå 38 cm skjoldlængde, og voksne dyr er planteædere. Et voksent dyr kræver et meget stort, filtreret kar, en varm solplads og kraftig UVB.

Familie: Emydidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-38 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-33 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**200 × 100 × 70 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-31 °C**
Hotspot	**30-40 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 30-45 cm
Vandtemperatur	**21-31 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, færdigfoder, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**36-96 mdr.**
Kuldstørrelse	**7-26 æg**
Kuld pr. år	**3-6**
Inkubation	**45-80 dage** ved 25-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ikke på CITES-listerne og ikke i EU-bilag A-D (kontrolleret mod slægts- og familielistninger). Ikke på EU's liste over invasive arter af unionsbetydning; den eneste skildpadde på listen er *Trachemys scripta*.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Hold dyret i et stort akvarium, et kar eller en lukket indendørs dam, ikke i et almindeligt terrarie.
TEMPERATUR	Hos *Pseudemys nelsoni* skal solpladsens overflade skal være omkring 40 °C, målt med et infrarødt termometer et par timer efter, at lamperne er tændt, og luften over den 30-32 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*Pseudemys nelsoni* lever i vandet, så luftens fugtighed er ikke afgørende; 50-80 % i rummet er passende. Det afgørende er vandets renhed.
VAND OG VANDKVALITET	*Pseudemys nelsoni* lever i vandet, så det skal være dybt, rent og varmt. Vandet skal være mindst dobbelt så dybt, som skjoldet er bredt, og 30-45 cm passer til voksne dyr. Temperaturen er 21-31 °C for voksne dyr (se Temperatur).
LYS OG UVB	UVB er en nødvendighed. *Pseudemys nelsoni* er dagaktiv, soler sig meget og hører til Ferguson-zone 3. UV-indekset på solpladsens overflade skal være 3,0-4,0 og lavere andre steder i opstillingen, så dyret kan vælge.
FODER	*Pseudemys nelsoni* er en udpræget planteæder. Bortset fra de helt små unger, der også tager små insekter, æder den i naturen kun vandplanter som vallisneria, vandpest, vandlinse og pilblad samt alger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*P. nelsoni* er dagaktiv og soler sig i store grupper. Den er sky og glider ved den mindste forstyrrelse fra solpladsen i vandet, men vænner sig til faste rutiner.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA.