herpy

SKILDPADDER

Common Spider Tortoise

Pyxis arachnoides

Pyxis arachnoides er en lille, kritisk truet landskildpadde fra de tørre tornskove langs Madagaskars sydvestkyst. Skjoldet er højt hvælvet med et mønster, der ligner et spind, og voksne dyr er 10-12 cm lange og vejer 200-400 g. Arten er sjælden i fangenskab og formerer sig langsomt, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Pyxis aranoides; Bellemys arachnoides*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-15 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**200-400 g**
Levetid	**50-70 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og tørskov**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Hotspot	**32-38 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**220-330 dage** ved 29-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks I**
EU-bilag	**Bilag A**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Arten står på CITES liste I og i EU-bilag A. Køb, salg, udbud til salg og kommerciel udstilling kræver derfor som udgangspunkt et EU-certifikat for det enkelte dyr (forordning 338/97, art. 8 og 10). Certifikaterne udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg styrelsen, før du køber, sælger eller udstiller, og sørg for, at certifikatet følger dyret. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Pyxis arachnoides*. Arten holdes og opdrættes især i zoologiske haver og af specialister.
TEMPERATUR	Dyret skal holdes varmt. Om dagen skal der være 24-30 °C, og under en varmelampe i den ene ende en solplads på 32-38 °C, målt på underlaget. Om natten falder temperaturen til 18-22 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge omkring 50-70 %. Tallet er lånt fra *Astrochelys radiata* og skal ses som et udgangspunkt. Hold bunden let fugtig, og forstøv terrariet af og til.
LYS OG UVB	*P. arachnoides* er dagaktiv. Sollys er det bedste, og indendørs skal arten have UVB-lys med en solplads i Ferguson-zone 3. Zonen er lånt fra *Astrochelys radiata* og ikke målt for arten.
FODER	I naturen æder *P. arachnoides* unge blade, blomster, frugter, insektlarver og ekskrementer fra større dyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Håndtér dyret så lidt som muligt, især unger. Ved fare trækker det hoved, ben og hale ind i skjoldet.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/skildpadder/pyxis-arachnoides