herpy

SKILDPADDER

Common Box Turtle

Terrapene carolina

Terrapene carolina er en lille, højhvælvet og landlevende sumpskildpadde fra det østlige Nordamerika. Bugpladen har et hængsel, så dyret kan lukke sig helt inde i skjoldet. Arten er dagaktiv, altædende og meget langlivet, men den kræver fugtighed, en stor indhegning, rolig pasning og som regel en omhyggeligt styret vinterhvile.

Familie: Emydidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**11-20 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**40-50 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**160 × 80 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Hotspot	**29-31 °C**
Temperatur, nat	**10-20 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-5 cm
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt, færdigfoder, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-8 æg**
Inkubation	**50-90 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står på CITES liste II og i EU-bilag B (forordning 338/97), som alle arter i slægten *Terrapene*. Køb og salg kræver derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES- og EU-papirer. Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV), før du køber eller sælger. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Terrapene carolina* trives bedst i en stor, sikker indhegning udendørs, og en stor indhegning er altid bedre end en lille. Vælg en solrig, vindbeskyttet plads med veldrænet jord, morgensol og skygge hele dagen.
TEMPERATUR	Indendørs skal der være en solplads på 29-31 °C og en kølig zone på 21-24 °C. Brug 50 W halogenspots, én til en ung skildpadde og mindst to til en voksen, og mål overfladetemperaturen på soldækket med en digital sonde.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*T. carolina* kommer fra fugtige levesteder og trives ved en gennemsnitlig luftfugtighed på 60-80 %, der aldrig må falde under ca. 50 %.
LYS OG UVB	*T. carolina* er dagaktiv og har brug for kraftigt lys og UVB for at danne D3-vitamin. Brug et T5 HO UVB-rør på ca. 6 % over solpladsen, så det overlapper varmelamperne.
FODER	*T. carolina* er altædende. De første 5-6 år er unge dyr overvejende kødædere, mens voksne æder mere plantekost.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*T. carolina* er sky og dårligt egnet til at blive taget op. Mange dyr lærer dog deres holder at kende, tager mad ud af fingrene og nyder en blid skjoldmassage.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA, Mexico og Canada.