herpy

SKILDPADDER

Græsk landskildpadde

Testudo hermanni

Testudo hermanni er en lille, gul og sort landskildpadde fra Sydeuropa og en af de mest holdte skildpadder i Europa. Den hører hjemme udendørs om sommeren, holder vinterhvile, lever af vilde urter og kan blive mange årtier gammel.

Familie: Testudinidae Engelsk: Hermann's Tortoise Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**30-80 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**200 × 100 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Hotspot	**32-38 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**4-6 °C** 8-16 uger
Kost	**Planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**96-144 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-15 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**55-85 dage** ved 26-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag A**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står på CITES liste II og i EU-bilag A. Køb, salg, udbud til salg og kommerciel udstilling kræver derfor som udgangspunkt et EU-certifikat for det enkelte dyr (forordning 338/97, art. 8 og 10). Certifikaterne udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg styrelsen, før du køber, sælger eller udstiller, og sørg for, at certifikatet følger dyret.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Testudo hermanni* hører hjemme udendørs i sommerhalvåret og har det dårligt i et lukket glasterrarie.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 22-30 °C, med en solplads under en varmelampe på 32-38 °C, så dyret kan varme sig op til mindst 30 °C. Om natten falder temperaturen til 15-20 °C, og varmen slukkes.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra et sommertørt klima, og luftfugtigheden skal være moderat: 40-70 %, højest for unger. Bunden skal være tør i overfladen og lidt fugtig længere nede, så dyret kan grave sig ned i et fugtigere lag.
LYS OG UVB	*T. hermanni* er dagaktiv og skal have UVB for at danne D3-vitamin og undgå knoglesygdom. Brug et T5-rør eller en kraftig UVB-pære til ørkenarter (Ferguson-zone 3, omkring 10-12 % UVB), monteret 25-40 cm over dyret.
FODER	*T. hermanni* er planteæder, og kosten skal være fiberrig, proteinfattig og kalkrig. Grundfoderet er vilde urter og blade: mælkebøtte, kløver, vejbred, skræppe, morbærblade og sunde græsser, gerne plukket frisk.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er rolig, men ikke et kæledyr, der skal tages op og kæles for. Den lærer sin holder at kende og kommer gerne, når der er mad. Håndtér den kun, når det er nødvendigt, og støt altid under bugpladen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Spanien, Frankrig, Italien, Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Bulgarien, Rumænien, Grækenland og Tyrkiet.