herpy

SKINKER

Ocellated (Bronze) Skink

Chalcides ocellatus

Chalcides ocellatus er en livlig, dagaktiv skink fra Middelhavsområdet, Nordafrika og Mellemøsten med en glat, valseformet krop, små ben og lyskantede øjepletter på ryggen. Den svømmer gennem løst sand, føder levende unger og er nysgerrig og nem at se. Den trives i et tørt terrarie med sandet bund, en varm solplads og fugtige nætter.

Familie: Scincidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-30 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**22-39 g**
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**33-37 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**15-35 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**2-12 unger**
Kuld pr. år	**1-2**
Drægtighed	**90-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et enkelt dyr skal have et terrarie på mindst 75 × 30 × 30 cm, og 90 × 45 × 30 cm eller større er bedre.
TEMPERATUR	*Chalcides ocellatus* elsker sol og har brug for en tydelig temperaturgradient. Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 43-49 °C, målt med et infrarødt termometer, og lufttemperaturen over den skal være 33-37 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal følge rytmen i naturen: tør om dagen og fugtig om natten. Om dagen skal terrariet tørre ud til 15-35 %, og om natten må den stige til 90-100 %.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og har brug for kraftigt lys og UVB. Den hører til Ferguson-zone 2, og UV-indekset skal være 2-3 på solpladsen og lavere i resten af terrariet.
FODER	Arten er først og fremmest insektæder og tager i naturen næsten alt, den kan overmande: græshopper, fårekyllinger, myrer, biller, bænkebidere, edderkopper, skolopendre og insektlarver.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Chalcides ocellatus* er aktiv og nysgerrig, men ikke et dyr til jævnlig håndtering: den er glat og hurtig og forsvinder let, hvis den bliver bange.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Italien, Malta, Grækenland, Cypern, Tyrkiet, Libanon, Syrien, Jordan, Israel, De palæstinensiske områder, Irak, Iran, Saudi-Arabien, Yemen, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Turkmenistan, Pakistan, Marokko, Vestsahara, Mauretanien, Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten, Niger, Mali, Sudan og Tchad.