herpy

SKINKER

Iberian Three-Toed Skink

Chalcides striatus

Chalcides striatus er en slank, næsten slangelignende skink fra Den Iberiske Halvø, Sydfrankrig og Liguria med små ben, tre tæer på hver fod og mørke længdestriber. Den lever skjult i fugtig, lav vegetation og føder levende unger. Pasningen er næsten ukendt, så vejledningen bygger på arten i naturen og på slægtningene *Chalcides chalcides* og *Chalcides ocellatus*.

Familie: Scincidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**28-43 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**12-20 g**
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 40 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**8-12 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**36-48 mdr.**
Kuldstørrelse	**4-15 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**58-86 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført i CITES eller i EU's bilag A-D, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen skinker står på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Chalcides striatus*. Levestedet er kendt: fugtig, tæt og lav vegetation med kølige nætter og en vinterhvile.
TEMPERATUR	Arten er dagaktiv og soler sig. Dagtemperaturen skal være 22-28 °C med en solplads på 32-35 °C lufttemperatur, og overfladen direkte under varmelampen kan nå 40-45 °C, målt med et infrarødt termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten lever i fugtig vegetation, men ikke i vand. Luftfugtigheden skal være moderat, 40-70 %, og bunden skal være let fugtig i dybden og tør i overfladen.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig, så den har brug for kraftigt lys og UVB. Ferguson-zone 2 passer: UV-indeks 2-3 på solpladsen og lavere i resten af terrariet. Et T5 HO-rør på 5-6 % over solpladsen i 25-35 cm afstand giver det.
FODER	I naturen æder *Chalcides striatus* leddyr, især edderkopper, biller og tæger; byttets længde er 1-36 mm.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Chalcides striatus* er sky og lever skjult. I terrariet ses den mest, når den soler sig eller jager. Den er hurtig og glat og undslipper let en hånd, så den egner sig ikke til håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Portugal, Spanien, Gibraltar, Frankrig og Italien.