herpy

SKINKER

Snohaleskink

Corucia zebrata

Verdens største skink: en rolig, trælevende planteæder fra Salomonøerne med en gribehale, der virker som et femte ben. *Corucia zebrata* lever i familiegrupper, føder store, levende unger og kræver et højt, fugtigt og godt ventileret terrarie samt masser af friske blade. En art for den erfarne holder med tålmodighed.

Familie: Scincidae Engelsk: Monkey Skink Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**60-80 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**500-850 g**
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**29-31 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**70-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Frugt og planter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1-2 unger**
Drægtighed	**180-240 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står på CITES liste II og bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private. CITES-papirer udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV), som kan spørges ved tvivl.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Arten lever hele livet i træerne og skal have et højt terrarie. En voksen skink skal have mindst 120 × 60 × 120 cm (længde × bredde × højde), og højden er vigtigere end gulvarealet.

TEMPERATUR

Arten har brug for moderat varme. Om dagen skal temperaturen være 24-28 °C, og en lun plads højt oppe i terrariet må nå 29-31 °C. Om natten må den falde til 21-24 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være 70-80 %. Den holdes med sprøjtning 2-3 gange om dagen eller et automatisk sprøjteanlæg, en fugtig bund og levende planter. Et hygrometer i dyrets egen højde viser, om niveauet holder.

LYS OG UVB

Arten er mest aktiv i skumringen og kan holdes uden UVB, hvis D3 gives gennem foderet, men et svagt UVB-lys anbefales. Ferguson-zone 2 er et skøn ud fra artens levevis i skyggen og skumringen.

FODER

Corucia zebrata er planteæder og æder i naturen blade, blomster, frugt og skud af flere planter, bl.a. *Epipremnum*, som dyret tåler trods de mange oxalatkrystaller. Kosten skal være bred og frisk.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er rolig og bevidst i sine bevægelser og flygter sjældent. Føler den sig truet, åbner den munden og hvæser, og en voksen skink kan bide smertefuldt gennem huden.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Salomonøerne og Papua Ny Guinea.