herpy

SKINKER

Pink-Tongued Lizard

Cyclodomorphus gerrardii

Cyclodomorphus gerrardii er en slank, rolig skink fra det østlige Australien med lyserød tunge, mørke tværbånd og en lang, svagt gribende hale. Arten bliver 40-45 cm lang, lever i fugtig skov, er mest aktiv i skumringen og om natten og lever i naturen næsten kun af snegle. Den får levende unger, ofte mange i hvert kuld, og voksne dyr er meget medgørlige.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Hemisphaeriodon gerrardii; Tiliqua gerrardii; Hinulia gerrardii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-45 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-30 °C**
Hotspot	**33-36 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**16-22 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter, frugt, færdigfoder, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**22-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**10-30 unger**
Drægtighed	**90-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført i CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så der kræves ingen CITES-papirer. Køb dyr med dokumentation for oprindelsen. Ingen skinker står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde). Arten graver, men klatrer også lidt i skråtstillede grene og korkbark, så en let klatrestruktur er et plus.

TEMPERATUR
Lufttemperaturen skal være 25-30 °C om dagen, med en kølig ende på 20-25 °C. Solpladsens overflade skal være 33-36 °C. Mål overfladetemperaturen med et infrarødt termometer og lufttemperaturen i begge ender.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten kommer fra fugtig skov, og en luftfugtighed på 60-80 % er passende. Angivelserne svinger fra 50-70 % til 70-90 %, og ved den høje ende skal terrariet være godt ventileret.

LYS OG UVB
Dyret er mest aktivt i skumringen og om natten og lever i skovbunden, men har gavn af svag UVB.

FODER
I naturen lever *Cyclodomorphus gerrardii* næsten udelukkende af snegle og nøgensnegle, og de store, flade tænder bagest i munden bruges til at knuse sneglehuse. Snegle er derfor den største udfordring i pasningen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Voksne dyr er blandt de mest rolige og medgørlige skinker. De bevæger sig langsomt og er lette at løfte. Unger er mere sky og tømmer tarmen ved håndtering, så håndtering holdes på et minimum, til dyret er vant til dig.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.