herpy

SKINKER

Cunningham's Skink

Egernia cunninghami

En stor, dagaktiv og meget social skink med pigget hale fra det tempererede sydøstlige Australien. *Egernia cunninghami* lever i familiegrupper i klippesprækker, føder levende unger og ligger i dvale i de kolde måneder. Den kræver et stort, solbeskinnet terrarie med solide klippestrukturer og UVB.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Tiliqua cunninghami* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**200-350 g**
Levetid	**20-27 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**12-18 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**60 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-8 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**90 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (Australien, som alle *Egernia*-arter) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Egernia cunninghami* er en stor art, og den kræver et rummeligt terrarie. Et par skal have mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde); 120 × 40 × 40 cm er den absolutte nedre grænse og giver kun lidt plads til en gradient.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig gradient: 31-35 °C i den varme ende og omkring 25 °C i den kølige.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*Egernia cunninghami* kommer fra tempererede klippeskove, og en luftfugtighed på 40-60 % passer. Forstøv terrariet let et par gange om ugen, og hold et fugtigt skjul i den kølige ende, så dyret selv kan vælge.
LYS OG UVB	*Egernia cunninghami* er dagaktiv, soler sig meget og skal have UVB, så længe lyset er tændt. Et UVB-rør på 5-6 % i reflektor over solpladsen, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde, giver Ferguson-zone 3.
FODER	*Egernia cunninghami* er altædende, men voksne dyr er overvejende planteædere: i naturen består over 90 % af deres føde af plantedele. Unge dyr æder langt flere leddyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Egernia cunninghami* er et af de mest sociale krybdyr: den lever i langvarige familiegrupper.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.