herpy

SKINKER

Hosmer's Spiny-tailed Skink

Egernia hosmeri

Egernia hosmeri er en rødbrun, pigget skink fra de tørre, klippefyldte egne i det nordlige Australien. Den er dagaktiv, altædende og føder levende unger. Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen, så vejledningen bygger på arten i naturen og på de nære slægtninge *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*.

Familie: Scincidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**28-30 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**125-135 g**
Levetid	**10-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1-8 unger**
Drægtighed	**90-150 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (Australien, som alle *Egernia*-arter) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Egernia hosmeri*.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig gradient. Om dagen er luften 27-32 °C. Under en halogenspot ligger en stor, flad sten, hvis overflade skal nå 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den kølige ende ligger omkring 27 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra tørre egne, og luftfugtigheden skal være 30-50 %. Forstøv terrariet let et par gange om ugen, og hold bunden let fugtig under ét skjul i den kølige ende, så dyret selv kan vælge.
LYS OG UVB	*Egernia hosmeri* er dagaktiv og skal have UVB, så længe lyset er tændt. Et UVB-rør i reflektor over solpladsen, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde, giver Ferguson-zone 3.
FODER	*Egernia hosmeri* er altædende og æder i naturen insekter, blade, skud og bær. Giv grønt og vilde urter som mælkebøtte, kløver og endivie, hakkede grøntsager som squash og sød kartoffel, blomster og lidt frugt som godbid.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyrenes sociale liv er ikke dokumenteret for *Egernia hosmeri*. Slægtens arter lever i faste par og stabile familiegrupper i årevis, men fremmede voksne dyr kan komme i alvorlig strid.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/skinker/egernia-hosmeri