herpy

SKINKER

Hosmer's Spiny-tailed Skink

Egernia hosmeri

Egernia hosmeri er en rødbrun, pigget skink fra de tørre, klippefyldte egne i det nordlige Australien. Den er dagaktiv, altædende og føder levende unger. Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen, så vejledningen bygger på arten i naturen og på de nære slægtninge *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*.

Familie: Scincidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**28-30 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**125-135 g**
Levetid	**10-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1-8 unger**
Drægtighed	**90-150 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (Australien, som alle *Egernia*-arter) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Om arten

Egernia hosmeri er en kraftig, kompakt skink med korte ben. Oversiden er rødbrun med spredte, mørkere og lysere pletter på ryggen, benene og halen. Hoved og hals er mørkere brune, bugen er hvid, og under hagen sidder nogle få mørkebrune pletter. Voksne dyr måler omkring 18 cm fra snude til kloak, og den rundede, tilspidsede hale er omkring 60 % så lang som kroppen, så den samlede længde er omkring 29 cm. Voksne dyr vejer omkring 125-135 g. Levealderen er ikke dokumenteret, men arten bliver mindst otte år i fangenskab, og 10-25 år i boksen svarer til *Egernia stokesii*.

Halen er fladere og mere pigget end hos den nærmeste slægtning, *Egernia cunninghami*. Arten er levendefødende. Kønnene ligner hinanden, så sikker kønsbestemmelse kræver en dyrlæge, der kan undersøge kloakken med et endoskop.

Udbredelse og levested

Egernia hosmeri findes i de tørre, klippefyldte egne af Queensland og Northern Territory i det nordlige Australien: fra Einasleigh-højlandet i øst over sletterne syd for Carpentaria-bugten og Mount Isa-egnen til højlandet ved Gulf Fall i Northern Territory. Typelokaliteten er Kaban i Queensland. Arten findes kun i Australien og er ikke truet.

Australien tillader ikke eksport af vilde krybdyr, så alle dyr i handlen uden for Australien stammer fra opdræt.

> **Oprindelig udbredelse:** Australien.

LEVESTED

Arten lever på klippefremspring og i lavt, åbent skovland og tuegræsland, hvor sprækker mellem klipper og sten giver skjul. Den er dagaktiv og lever på jorden og på klipperne. Føden er insekter, blade, skud og bær.

Klimaet i området er varmt med en regntid om sommeren. Årsrytme, socialt liv og yngletid i naturen er ikke dokumenteret.

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Egernia hosmeri*. Anbefalingerne bygger på klimaet og levestedet, på arten i naturen og på de nære slægtninge *Egernia stokesii*, *Egernia cunninghami* og *Egernia striolata*, som har samme krav til lys, varme og indretning. Tallene er lånt derfra, hvor andet ikke er nævnt.

Egernia hosmeri er omtrent lige så stor som *Egernia stokesii*, og målene er lånt derfra: et par skal have mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Et enkelt dyr kan holdes i lidt mindre, men gulvarealet bør ikke være under 90 × 45 cm.

Bunden kan være en blanding af jord, sand og kokosfibre med et lag på mindst 10 cm; undgå fint sand alene, fordi det kan give øjenirritation og tarmforstoppelse. Byg sprækker og huler af flade sten, skifer og kork direkte på bunden, så de ikke kan undergraves. Der skal være mindst to skjul, en stor, flad solsten og en stabil vandskål. Terrariet skal være godt ventileret og have et tæt, flugtsikkert låg.

TEMPERATUR

Terrariet skal have en tydelig gradient. Om dagen er luften 27-32 °C. Under en halogenspot ligger en stor, flad sten, hvis overflade skal nå 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den kølige ende ligger omkring 27 °C. Om natten må temperaturen falde til 18-24 °C.

Tallene er lånt fra *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami* og passer til en art fra et varmt, tørt klippeland. Keramiske varmelegemer og varmemåtter er ikke nok som eneste varmekilde. Om arten har brug for en køligere vinterperiode i terrarier, er ikke dokumenteret.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Arten kommer fra tørre egne, og luftfugtigheden skal være 30-50 %. Forstøv terrariet let et par gange om ugen, og hold bunden let fugtig under ét skjul i den kølige ende, så dyret selv kan vælge. Der skal altid stå en stabil, lav vandskål med frisk vand. Skift vandet dagligt, og vask skålen hver uge.

Læs mere: Luftfugtighed, forstøvning og ventilation

LYS OG UVB

Egernia hosmeri er dagaktiv og skal have UVB, så længe lyset er tændt. Et UVB-rør i reflektor over solpladsen, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde, giver Ferguson-zone 3. Zonen er lånt fra *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*. Placér solpladsen, så dyrets ryg er mindst 20 cm fra røret; afstanden afhænger af rørets styrke. UVB trænger ikke gennem glas eller plast, og rørene skiftes efter fabrikantens anvisning.

Supplér med stærkt, hvidt dagslys. Lysperioden er omkring 12-14 timer.

Læs mere: Lys og UVB Læs mere: Varme og temperatur

FODER

Egernia hosmeri er altædende og æder i naturen insekter, blade, skud og bær. Giv grønt og vilde urter som mælkebøtte, kløver og endivie, hakkede grøntsager som squash og sød kartoffel, blomster og lidt frugt som godbid. Dertil kommer insekter som kakerlakker, fårekyllinger, græshopper og melorme samt snegle. Vask alt grønt og vilde urter, før det gives.

Unge dyr fodres dagligt med flere insekter, voksne omkring tre gange om ugen i små portioner, skiftevis grønt og dyrisk føde. Drys insekter og grønt let med kalk, og giv et vitamintilskud en gang om ugen. Kost med meget fedt giver fedme.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Dyrenes sociale liv er ikke dokumenteret for *Egernia hosmeri*. Slægtens arter lever i faste par og stabile familiegrupper i årevis, men fremmede voksne dyr kan komme i alvorlig strid. Hold derfor arten enkeltvis eller parvis, og tilføj kun nye dyr efter karantæne og under opsyn. Skil dyrene ad, hvis de slås.

Dyrene er sky og egner sig ikke til meget håndtering, men bliver mere tillidsfulde ved fodring fra pincet. Rolig adfærd og faste rutiner mindsker stress.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Kønnene ligner hinanden, og sikker kønsbestemmelse kræver en dyrlæge, der kan undersøge kloakken med et endoskop. Hunner har en lodret fold midt i kloakkammeret, som hanner ikke har. Alderen ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret.

PARRING

Parringens forløb og en eventuel vinterhvile før parring er ikke dokumenteret. I fangenskab ligger parringstiden formentlig i december. Et fast par, der har levet sammen længe, er det sikreste udgangspunkt for avl, fordi slægtens arter danner faste par.

Læs mere: Vinterhvile og årstider

ÆGLÆGNING OG KULD

Arten føder levende unger, i gennemsnit fire i et kuld. Spændet på 1-8 unger i boksen er lånt fra *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*. Hvor ofte hunnen føder, er ikke dokumenteret; slægtningene får ét kuld om året. Giv hunnen brede, flade skjul, hvor hun kan føde.

INKUBATION

Der er ingen æg at udruge. Drægtighedens længde er ikke dokumenteret for *Egernia hosmeri*. Hos slægtningene varer den omkring tre måneder (*Egernia stokesii*, *Egernia cunninghami*) og op til fem måneder (*Egernia kingii*), og boksens 90-150 dage er lånt derfra. Giv den drægtige hun ekstra føde, kalk og UVB, og hold terrariet roligt.

OPDRÆT AF UNGER

Ungernes størrelse ved fødslen er ikke dokumenteret. Giv dem et terrarie med mange skjul, UVB og små insekter og finthakket grønt dagligt, drysset med kalk. Hold ungerne under opsyn, og skil dem fra de voksne, hvis der ses aggression.

Sundhed og typiske fejl

Egernia hosmeri er hårdfør, når temperatur, lys og bund er rigtige. De typiske problemer er:

- Kalkmangel og knogleskørhed ved for lidt UVB og ensidig kost.
- Fedme ved for meget fedtholdig føde og lidt bevægelse.
- Svampeinfektion på bug og fødder ved vedvarende fugtigt underlag.
- Indvendige og udvendige parasitter, især hos nye dyr.
- Kampskader og stress ved for tæt eller uroligt hold.

Sæt nye dyr i karantæne i mindst en måned, før de kommer sammen med andre. Dyrene skjuler sygdom godt, så kontakt en dyrlæge med erfaring i krybdyr ved ændret appetit, vægttab eller hævelser.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.