herpy

SKINKER

King's Skink

Egernia kingii

En stor, tung og næsten sort skink fra Australiens sydvestkyst. *Egernia kingii* er altædende, føder levende unger og lever længe. Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasning i terrarium, så vejledningen bygger på arten i naturen og på de nære slægtninge *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Tiliqua kingii*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**55 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**220-360 g**
Levetid	**20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-32 °C**
Hotspot	**38-45 °C**
Temperatur, nat	**14-20 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**36-60 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-8 unger**
Drægtighed	**140-154 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (Australien, som alle *Egernia*-arter) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Egernia kingii*.
TEMPERATUR	Om dagen skal luften være 25-32 °C med en tydelig gradient fra den kølige til den varme ende. Under en halogenspot ligger en stor, flad sten, hvis overflade skal nå 38-45 °C målt med et infrarødt termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 40-60 %. Forstøv terrariet let et par gange om ugen, og hold bunden let fugtig under ét skjul i den kølige ende, så dyret selv kan vælge. Der skal altid stå en stor vandskål med frisk vand fremme.
LYS OG UVB	*Egernia kingii* er dagaktiv og skal have UVB, så længe lyset er tændt. Et UVB-rør i reflektor over solpladsen, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde, giver Ferguson-zone 3.
FODER	*Egernia kingii* er altædende. I naturen består føden mest af blød plantedel, suppleret med insekter og fugleæg.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er en stor og kraftig skink. Dyrenes sociale liv er ikke dokumenteret på samme måde som hos *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*, som lever i familiegrupper.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/skinker/egernia-kingii