herpy

SKINKER

King's Skink

Egernia kingii

En stor, tung og næsten sort skink fra Australiens sydvestkyst. *Egernia kingii* er altædende, føder levende unger og lever længe. Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasning i terrarium, så vejledningen bygger på arten i naturen og på de nære slægtninge *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Tiliqua kingii*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**55 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**220-360 g**
Levetid	**20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-32 °C**
Hotspot	**38-45 °C**
Temperatur, nat	**14-20 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**36-60 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-8 unger**
Drægtighed	**140-154 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (Australien, som alle *Egernia*-arter) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Om arten

Egernia kingii er en stor, kraftigt bygget skink. Kroppen og halen er sort eller mørkegrå, ofte med små, hvidlige pletter eller korte streger, og rygskællene er kølede. Overlæben er mørk, og der er ingen brede, lyse længdestriber. Voksne dyr når 24 cm fra snude til kloak og en samlet længde på op til omkring 55 cm, og de vejer 220-360 g. Halen kan smides, og et voksent dyr beholder evnen hele livet.

Arten hører til den australske *Egernia*-gruppe af store skinker, hvoraf flere lever i familiegrupper. Ungerne er spinkle ved fødslen og vejer omkring 7 g. Arten bliver først kønsmoden efter 3-5 år og formentlig omkring 20 år gammel. Arten er i familie med *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*, som er bedre kendt i terrarier.

Udbredelse og levested

Egernia kingii findes kun i det sydvestlige Western Australia, i kystnære egne. Den er almindelig på øerne Rottnest Island og Penguin Island og på kysten i åben skov og åben lynghede. Arten er ikke truet.

Australien tillader ikke eksport af vilde krybdyr, så alle dyr i handlen uden for Australien stammer fra opdræt.

> **Oprindelig udbredelse:** Australien.

LEVESTED

Levestedet er kystlandskabet i sydvest: åben skov, åben lynghede og kystkrat med et tempereret, middelhavsagtigt klima med varme, tørre somre og milde, våde vintre.

Føden er overvejende blød plantedel fra den lokale vegetation, suppleret med insekter og fuglenes æg. Arten er selv bytte for mange rovdyr, blandt andre tigerslanger (*Notechis*). Ungerne dør ofte, og væksten til voksen størrelse er langsom, så de voksne dyr lever længe.

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Egernia kingii*. Anbefalingerne bygger på klimaet i udbredelsesområdet, på arten i naturen og på de nære slægtninge *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*, som har samme krav til lys, varme og indretning. Tallene er lånt derfra, hvor andet ikke er nævnt.

Egernia kingii er større end begge slægtninge, så målet er sat op i forhold til deres: et par skal have mindst 150 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Bunden kan være en blanding af jord, kokosfibre og bark med et lag på mindst 10 cm; undgå fint sand alene, fordi det kan give øjenirritation og tarmforstoppelse.

Byg skjul og sprækker af flade sten, skifer og kork direkte på bunden, så de ikke kan undergraves. Der skal være mindst to skjul, en stor, flad solsten og en stor, stabil vandskål, som dyret kan bade i. Terrariet skal være godt ventileret og have et tæt, flugtsikkert låg.

TEMPERATUR

Om dagen skal luften være 25-32 °C med en tydelig gradient fra den kølige til den varme ende. Under en halogenspot ligger en stor, flad sten, hvis overflade skal nå 38-45 °C målt med et infrarødt termometer. Om natten må temperaturen falde til 14-20 °C.

Tallene er lånt fra *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami* og passer til et tempereret kystklima. Arten har i naturen en kølig vinter; kortere dage og lidt lavere temperaturer om vinteren følger dens rytme. Om en egentlig vinterhvile er nødvendig i terrarier, er ikke dokumenteret.

Læs mere: Vinterhvile og årstider

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være 40-60 %. Forstøv terrariet let et par gange om ugen, og hold bunden let fugtig under ét skjul i den kølige ende, så dyret selv kan vælge. Der skal altid stå en stor vandskål med frisk vand fremme. Skift vandet dagligt, og vask skålen hver uge.

Læs mere: Luftfugtighed, forstøvning og ventilation

LYS OG UVB

Egernia kingii er dagaktiv og skal have UVB, så længe lyset er tændt. Et UVB-rør i reflektor over solpladsen, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde, giver Ferguson-zone 3. Zonen er lånt fra *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*. Placér solpladsen, så dyrets ryg er mindst 20 cm fra røret; afstanden afhænger af rørets styrke. UVB trænger ikke gennem glas eller plast, og rørene skiftes efter fabrikantens anvisning.

Supplér med stærkt, hvidt dagslys. Lysperioden er omkring 14 timer om sommeren og 12 timer om vinteren.

Læs mere: Lys og UVB Læs mere: Varme og temperatur

FODER

Egernia kingii er altædende. I naturen består føden mest af blød plantedel, suppleret med insekter og fugleæg. Giv derfor voksne dyr en stor del grønt og vilde urter som mælkebøtte, kløver, endivie og kål, hakkede grøntsager som squash og sød kartoffel, blomster og lidt frugt som godbid. Dertil kommer insekter som kakerlakker, fårekyllinger, græshopper og melorme samt snegle. Små mængder kogt æg eller magert kød kan indgå, men skal ikke fylde meget. Vask alt grønt og vilde urter, før det gives.

Unge dyr fodres dagligt med flere insekter, voksne tre gange om ugen i små portioner, skiftevis grønt og dyrisk føde. Drys insekter og grønt let med kalk, og giv et vitamintilskud en gang om ugen. Kost med meget kød og fedt giver fedme.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er en stor og kraftig skink. Dyrenes sociale liv er ikke dokumenteret på samme måde som hos *Egernia stokesii* og *Egernia cunninghami*, som lever i familiegrupper. Hold derfor *Egernia kingii* parvis eller enkeltvis, og tilføj kun nye dyr efter karantæne og under opsyn. Skil dyrene ad, hvis de slås.

Dyrene egner sig ikke til meget håndtering, men bliver mere tillidsfulde ved fodring fra pincet. Rolig adfærd og faste rutiner mindsker stress.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Kønnene er svære at skelne udefra, og sikker kønsbestemmelse kræver en dyrlæge med erfaring i krybdyr. Arten vokser langsomt og bliver kønsmoden efter 3-5 år.

PARRING

Parringens forløb og en eventuel vinterhvile før parring er ikke dokumenteret for dyr i terrarier. En køligere periode med kortere dage om vinteren svarer til naturens rytme.

ÆGLÆGNING OG KULD

Arten føder levende unger. Et kuld er på 2-8 unger, som vejer omkring 7 g hver. Hvor ofte hunnen føder, er ikke dokumenteret. Ungerne fødes fuldt udviklede og klarer sig selv fra første dag, men de skal have skjul, hvor de voksne ikke kan jage dem.

INKUBATION

Der er ingen æg at udruge. Drægtigheden varer 20-22 uger. Giv den drægtige hun ekstra føde, kalk og UVB, og hold terrariet roligt. Der skal være brede, flade skjul, hvor hun kan føde.

OPDRÆT AF UNGER

Ungerne vejer omkring 7 g ved fødslen og måler 6-8 cm fra snude til kloak. Giv dem et terrarie med skjul, UVB og små insekter og finthakket grønt dagligt, drysset med kalk. Hold ungerne under opsyn, og skil dem fra de voksne, hvis der ses aggression. Dødeligheden er høj i naturen, og væksten er langsom.

Sundhed og typiske fejl

Egernia kingii er hårdfør, når temperatur, lys og bund er rigtige. De typiske problemer er:

- Kalkmangel og knogleskørhed ved for lidt UVB og ensidig kost.
- Fedme ved for meget fedtholdig føde og lidt bevægelse.
- Svampeinfektion på bug og fødder ved vedvarende fugtigt underlag.
- Indvendige og udvendige parasitter, især hos nye dyr.
- Kampskader og stress ved for tæt eller uroligt hold.

Sæt nye dyr i karantæne i mindst en måned, før de kommer sammen med andre. Dyrene skjuler sygdom godt, så kontakt en dyrlæge med erfaring i krybdyr ved ændret appetit, vægttab eller hævelser.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.