herpy

SKINKER

South-western Crevice Skink

Egernia napoleonis

En mellemstor, fladbygget og dagaktiv skink fra klipper og skove i det sydvestlige Australien. *Egernia napoleonis* gemmer sig i sprækker under bark og sten og føder levende unger. Der findes næsten ingen dokumenteret viden om pasning i terrarium, så vejledningen bygger på arten i naturen og på de nære slægtninge *Egernia striolata*, *Egernia cunninghami* og *Egernia kingii*.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Tiliqua napoleonis; Contundo napoleonis; Egernia bos*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-14 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**14-20 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1-6 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**90-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (Australien, som alle *Egernia*-arter) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen dokumenteret viden om pasningen af *Egernia napoleonis*.
TEMPERATUR	Om dagen skal luften være 25-30 °C med en tydelig gradient fra den kølige til den varme ende. Under en halogenspot ligger en flad sten eller gren, hvis overflade skal nå 35-40 °C målt med et infrarødt termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 40-60 %. Forstøv terrariet let et par gange om ugen, og hold bunden let fugtig under ét skjul i den kølige ende, så dyret selv kan vælge. Der skal altid stå en vandskål med frisk vand fremme.
LYS OG UVB	*Egernia napoleonis* er dagaktiv og skal have UVB, så længe lyset er tændt. Et UVB-rør i reflektor over solpladsen, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde, giver Ferguson-zone 3.
FODER	Føden er ikke dokumenteret for *Egernia napoleonis*, så fodringen følger de nære slægtninge: en altædende kost med mange insekter og en god del plantemateriale.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Egernia napoleonis* er en dagaktiv skink, der bruger sprækker som skjul og klatrer på bark og sten. Nære slægtninge i samme gruppe, fx *Egernia striolata*, lever i familiegrupper.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.