herpy

SKINKER

Gidgee Skink

Egernia stokesii

En robust, social skink med pigget hale fra det halvtørre Australien. *Egernia stokesii* lever i faste familiegrupper i klippesprækker og hule træstammer, føder levende unger og kan spærre sit skjul med den pigbesatte hale. Den kræver varme, UVB og et terrarie med solide klippestrukturer.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Silubosaurus stokesii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**21-28 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**100-200 g**
Levetid	**10-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**43-49 °C**
Temperatur, nat	**21-27 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1-8 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**90 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (Australien) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Egernia stokesii lever i grupper, og terrariet skal være stort nok til dem. Et par eller en lille gruppe på op til tre skal have mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde).

TEMPERATUR
Terrariet skal have en tydelig gradient. Solpladsen skal være 43-49 °C, målt på overfladen med et infrarødt termometer, og den kølige ende skal ligge omkring 27 °C. Dagtemperaturen i baggrunden er 27-32 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten kommer fra halvtørre områder, men trives bedst med en luftfugtighed på 40-60 %. Forstøv terrariet let om morgenen et par gange om ugen, og hold et fugtigt skjul i den kølige ende.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og skal have UVB, så længe lyset er tændt. Et T5 HO-rør i reflektor, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde, giver Ferguson-zone 3.

FODER
Egernia stokesii er altædende. I naturen æder voksne dyr mest planter: blade, blomster, frugt og frø, og plantedelen er størst om sommeren. Unge dyr æder flere insekter end voksne.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er social og lever i familiegrupper med et par, unger og halvvoksne afkom fra flere kuld. Den kan holdes i par eller i en lille gruppe, især hvis dyrene er vokset op sammen.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.