herpy

SKINKER

Tree Skink

Egernia striolata

En mellemstor, dagaktiv og meget social skink fra de tørre skove i det østlige Australien. *Egernia striolata* bor i sprækker i træer og klipper, lever i små familiegrupper og føder levende unger. Den kræver et højt terrarie med mange smalle skjul, en varm solplads og UVB.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Tropidolepisma striolatum; Tropidolepisma dorsale*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-12 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Tørskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 50 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-6 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**90 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (Australien, som alle *Egernia*-arter) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Egernia striolata* bruger højden og klatrer meget. Et par skal have mindst 80 × 50 × 60 cm (længde × bredde × højde).
TEMPERATUR	Om dagen skal luften være 25-30 °C med en tydelig gradient. Under en lampe ved den ene ende skal solpladsen nå 35-40 °C målt med et infrarødt termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra tørre til halvtørre skove, og luftfugtigheden skal være 30-50 %; tallet er et skøn ud fra levestedet. Forstøv ikke terrariet dagligt, men hold bunden tør og giv et let fugtigt skjul under hudskifte.
LYS OG UVB	*Egernia striolata* er dagaktiv og soler sig meget. Et UVB-rør i reflektor over solpladsen skal give UVB svarende til Ferguson-zone 3, som til *Egernia cunninghami* og *Egernia stokesii*.
FODER	*Egernia striolata* er altædende. Giv insekter som fårekyllinger, kakerlakker, melorme og græshopper, og suppler med finthakket grønt, vilde urter som mælkebøtte og kløver og lidt frugt.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er meget social og foretrækker at leve sammen, selv når der er plads til at leve alene. Et par eller en gruppe på tre til seks dyr, som er vokset op sammen, fungerer bedst.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/skinker/egernia-striolata