herpy

SKINKER

Algerian orange-tailed skink

Eumeces algeriensis

En stor, kraftig skink fra Marokko og Algeriet med brun grundfarve og tværgående lyse bånd med rødlige øjepletter. *Eumeces algeriensis* graver sig ned i tør jord, kræver sol, UVB og dyb bund og forveksles ofte med *Eumeces schneiderii*.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Eumeces schneideri algeriensis; Novoeumeces algeriensis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-45 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Hotspot	**38-45 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-15 æg**
Inkubation	**40-60 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført i CITES eller i EU's bilag A-D, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen skinker står på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET

Eumeces algeriensis lever på jorden og graver, så gulvarealet og bunden er det vigtigste. To dyr skal have mindst 120 × 60 × 45 cm (længde × bredde × højde); et enkelt dyr kan holdes i 90 × 45 × 40 cm.

TEMPERATUR

Terrariet skal have en tydelig gradient. Om dagen skal der være 24-30 °C, køligst i den ene ende og varmest nær solpladsen. Under en halogenspot skal solpladsen nå 38-45 °C, målt på overfladen med et infrarødt termometer.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Arten kommer fra tørre egne og skal holdes tørt: luftfugtigheden skal ligge under 40 %. Forstøv lidt en gang om dagen, hvis luften er meget tør, og to gange om dagen, når hudskiftet nærmer sig, og huden ser mat ud.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og skal have UVB i hele den tid, lyset er tændt. Den regnes til Ferguson-zone 3; tallet er lånt fra *Eumeces schneiderii*.

FODER

Eumeces algeriensis er altæder, men lever mest af insekter: fårekyllinger, kakerlakker, melorme, silkeorme, voksmøllarver og hornorme samt snegle og regnorme.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er mindre selskabelig end *E. schneiderii*. Den kan holdes enkeltvis, som par eller som to hunner, men aldrig to hanner sammen. Terrariet skal have flere skjul og solpladser. Nye dyr er ofte forsigtige.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Marokko og Algeriet.