herpy

SKINKER

Algerian orange-tailed skink

Eumeces algeriensis

En stor, kraftig skink fra Marokko og Algeriet med brun grundfarve og tværgående lyse bånd med rødlige øjepletter. *Eumeces algeriensis* graver sig ned i tør jord, kræver sol, UVB og dyb bund og forveksles ofte med *Eumeces schneiderii*.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Eumeces schneideri algeriensis; Novoeumeces algeriensis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-45 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Hotspot	**38-45 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-15 æg**
Inkubation	**40-60 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført i CITES eller i EU's bilag A-D, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen skinker står på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015).

Om arten

Eumeces algeriensis er en stor, kraftigt bygget skink med glatte, blanke skæl, et kort, trekantet hoved, korte ben og en lang hale. Grundfarven er brun til okker med uregelmæssige, lyse tværbånd, som veksler med bånd med rødlige øjepletter. Der er ingen længdestriber. Voksne dyr er 30-45 cm lange inklusive halen og lidt større og tungere bygget end *E. schneiderii*.

Arten blev tidligere regnet som underart af *Eumeces schneiderii* og har også stået i slægten *Novoeumeces*. Den regnes nu som selvstændig art med to underarter, *E. a. algeriensis* og *E. a. meridionalis*; om den sidste er en gyldig form, er uafklaret. De to arter forveksles ofte i handlen. *E. algeriensis* har tværgående bånd, ikke længdestriber.

Dyret er dagaktivt, graver meget og er mindre selskabeligt end *E. schneiderii*. Det soler sig villigt ved høje temperaturer og trækker sig bagefter ned i jorden eller ind under en sten.

Udbredelse og levested

Eumeces algeriensis findes i Marokko og Algeriet, under 1.700 m over havet. Underarten *E. a. meridionalis* hører til i det østlige Marokko og det nordvestlige Algeriet. Arten hører hjemme i Maghreb i Nordafrika og findes også i den spanske eksklave Melilla på Marokkos middelhavskyst.

> **Oprindelig udbredelse:** Marokko og Algeriet.

LEVESTED

Arten lever i en blanding af levesteder i Maghreb: middelhavskrat, åbne skove, græsland, sandede kyster, dyrket land og haver. Terrænet er ofte stenet, med hårdt komprimeret jord og pletter af sand. Dyrene graver sig ned under sten og holder sig derved kølige i de varmeste timer om sommeren.

De er dagaktive, soler sig og søger føde i dagens varme timer og trækker sig tilbage i selvgravede gange, når det bliver for varmt eller koldt.

Pasning

TERRARIET

Eumeces algeriensis lever på jorden og graver, så gulvarealet og bunden er det vigtigste. To dyr skal have mindst 120 × 60 × 45 cm (længde × bredde × højde); et enkelt dyr kan holdes i 90 × 45 × 40 cm. Tallene er lånt fra *Eumeces schneiderii*, som har samme krav.

Bunden skal være dyb, 10-15 cm, og løs: en blanding af kokosfibre, tørv eller orkidébark med højst 30 % sand. Mere sand giver risiko for forstoppelse. Læg flade stenplader direkte på terrariets bund, før bunden fyldes i, så dyret ikke kan undergrave dem. Giv et lavt, bredt skjul af tungt keramik med en lille åbning. Dyret er dårligt til at klatre, så grene bør være store stykker drivtræ på bunden, og højt placerede flader skal undgås, fordi dyret kan falde og komme til skade. Eventuelle planter skal være sukkulenter i potter.

Terrariet skal være helt tæt.

TEMPERATUR

Terrariet skal have en tydelig gradient. Om dagen skal der være 24-30 °C, køligst i den ene ende og varmest nær solpladsen. Under en halogenspot skal solpladsen nå 38-45 °C, målt på overfladen med et infrarødt termometer. Arten soler sig villigt ved høje temperaturer, men skal altid kunne søge ned i bunden.

Om natten slukkes varmen, og temperaturen må falde til 21-24 °C, men aldrig under 21 °C. Styr alle varmekilder med en termostat. Terrariet må ikke stå i direkte sollys, fordi temperaturen da hurtigt kan overstige 40 °C og dræbe dyret.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Arten kommer fra tørre egne og skal holdes tørt: luftfugtigheden skal ligge under 40 %. Forstøv lidt en gang om dagen, hvis luften er meget tør, og to gange om dagen, når hudskiftet nærmer sig, og huden ser mat ud. Et par steder må være fugtige som støtte under hudskifte.

Giv frisk vand i en lav skål, som dyret kan komme op af, og skift vandet dagligt. Dyret bader ofte og forurener hurtigt vandet.

Læs mere: Luftfugtighed, forstøvning og ventilation

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og skal have UVB i hele den tid, lyset er tændt. Den regnes til Ferguson-zone 3; tallet er lånt fra *Eumeces schneiderii*. Et T5-rør i reflektor over solpladsen giver UVB, og skal skiftes efter fabrikantens anvisning.

Lysperioden er omkring 12 timer om dagen i sommerhalvåret og omkring 10 timer om vinteren, med mørke om natten.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Eumeces algeriensis er altæder, men lever mest af insekter: fårekyllinger, kakerlakker, melorme, silkeorme, voksmøllarver og hornorme samt snegle og regnorme. Dyret er ikke hurtigt og fanger ikke altid hoppende byttedyr, så fodr gerne fra en skål eller pincet. Museunger gives kun som sjælden godbid, fordi de er fede, og dyret let bliver for tykt.

Voksne dyr fodres hver anden dag. Tilbyd grønt to gange om ugen, fx grønkål, kålblade og gulerod, selv om nogle dyr ikke vil have det. Drys foderet med kalk ved hver fodring og med et vitamintilskud en gang om ugen. Unge dyr behøver mest tilskud.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er mindre selskabelig end *E. schneiderii*. Den kan holdes enkeltvis, som par eller som to hunner, men aldrig to hanner sammen. Terrariet skal have flere skjul og solpladser.

Nye dyr er ofte forsigtige. Løft dyret nedefra, og tag aldrig fat ovenfra; et bid kan gøre ondt. Sæt nye dyr i karantæne i mindst 30 dage. Dyret graver meget og ses ofte kun om morgenen og ved fodring.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Alderen for kønsmodenhed er ikke dokumenteret for arten. Hannerne er kraftigere bygget og har et bredere hoved end hunnerne, men forskellen ses først tydeligt hos voksne dyr.

PARRING

Parringen er ikke dokumenteret for arten, og opdræt i fangenskab er sjældent. Hos den nære slægtning *Eumeces schneiderii* sker parringen om foråret efter en kølig periode, og hunnen sættes ind til hannen i en til to uger, så længe der ikke er aggression.

ÆGLÆGNING OG KULD

Arten lægger æg. Kuldstørrelsen er ikke dokumenteret; *Eumeces schneiderii* lægger 5-15 æg, og tallet i boksen er lånt derfra. Giv hunnen en æglægningskasse i den varme ende med et dybt, fugtigt lag af sand og vermiculit, så hun ikke tilbageholder æggene. Antal kuld pr. år er ikke dokumenteret.

INKUBATION

Æggene flyttes forsigtigt til en rugekasse med fugtig vermiculit og vendes ikke. Ved 28-30 °C klækker de efter omkring 40-60 dage; tallene er lånt fra *Eumeces schneiderii* og ikke dokumenteret for arten selv. Temperaturafhængig kønsbestemmelse er ikke dokumenteret.

Læs mere: Inkubation af æg

OPDRÆT AF UNGER

Ungerne holdes i et lille terrarie med løs, let fugtig bund, solplads og UVB. Giv små insekter dagligt, drysset med kalk, og hold dem adskilt, hvis de bider hinanden. Størrelse ved klækning og vækst er ikke dokumenteret for arten.

Sundhed og typiske fejl

Eumeces algeriensis er hårdfør, når temperatur, lys og bund er rigtige. De typiske problemer er:

- Dårlig appetit og afmagring, oftest på grund af for lav temperatur eller en svag varmepære.
- Kalkmangel og knogleskørhed ved for lidt UVB og ensidig kost.
- Forstoppelse, hvis dyret sluger sand sammen med byttet; en bund med højst 30 % sand og foder i skål nedsætter risikoen.
- Problemer med hudskift, tæer og ører, hvis luften er for tør under hudskiftet.
- Overophedning, hvis terrariet står i direkte sollys eller mangler et køligt sted.
- Fedme ved for meget fedtholdig føde.

Sæt nye dyr i karantæne i mindst 30 dage. Kontakt en dyrlæge med erfaring i krybdyr ved ændret appetit, vægttab eller hævelser.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.