herpy

SKINKER

Gold Skink

Eumeces schneiderii

En kraftig, glat og hurtig skink fra de tørre egne mellem Nordafrika og Centralasien. *Eumeces schneiderii* er sandfarvet til olivenbrun med orange pletter, graver sig villigt ned i løst sand og er en robust, langlivet terrarieart, når den får sol, UVB og dyb bund.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Eumeces schneideri; Novoeumeces schneideri* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-45 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-15 æg**
Inkubation	**40-60 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Pasning i korte træk

TERRARIET

Eumeces schneiderii lever på jorden og graver, så gulvarealet og bunden er det vigtigste. Et par eller en han med to hunner skal have mindst 120 × 60 × 45 cm (længde × bredde × højde).

TEMPERATUR

Terrariet skal have en tydelig gradient. Dagtemperaturen i baggrunden skal være 25-30 °C, og den kølige ende skal ligge omkring 24-27 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Arten kommer fra tørre egne og skal holdes tørt med en luftfugtighed på 20-40 %, i hvert fald under 50 %. Det er nok at forstøve let en gang om ugen.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og skal have UVB i hele den tid, lyset er tændt. Den hører til Ferguson-zone 3 og skal have et UV-indeks på omkring 3 på solpladsen.

FODER

Eumeces schneiderii er altædende, men æder især levende insekter og andre smådyr: fårekyllinger, kakerlakker, melorme, superorme, silkeorme, snegle og regnorme. Mange dyr æder aldrig grønt, andre tager lidt frugt eller grønt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er nysgerrig og undersøger gerne sine omgivelser. Nye dyr er ofte forsigtige, men med tålmodighed og fodring fra pincet bliver de rolige. Løft dyret nedefra, og tag aldrig fat ovenfra; et bid kan gøre ondt.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten, Israel, De palæstinensiske områder, Cypern, Tyrkiet, Syrien, Libanon, Jordan, Iran, Irak, Saudi-Arabien, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Rusland, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Afghanistan og Pakistan.