herpy

SKINKER

Bali Sun Skink

Eutropis multifasciata

En hurtig, dagaktiv skink fra skovkanter og lysninger i Sydøstasien. *Eutropis multifasciata* har bronzebrun ryg, jager insekter i løvet og føder levende unger. Den kræver varme, høj luftfugtighed, UVB og et rummeligt terrarie med løs bund.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Mabuya multifasciata; Scincus multifasciatus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-33 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**35-41 °C**
Temperatur, nat	**21-25 °C**
Luftfugtighed	**70-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og frugt**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**11-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-10 unger**
Drægtighed	**60-90 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Om arten

Eutropis multifasciata er en slank, glat og hurtig skink med korte ben, spids snude og lang, tynd hale. Ryggen er bronzebrun, og hvert rygskæl har tre køle, og siderne er mørke, gule eller rødorange. Struben er hvid til gul. Kroppen fra snude til kloak er op til 14 cm, og den samlede længde er omkring 25-33 cm.

Arten er hurtig og sky og klatrer godt. Udseendet varierer med udbredelsesområdet, og ældre navne som *Mabuya multifasciata* optræder stadig i handlen.

Udbredelse og levested

Eutropis multifasciata har en meget stor udbredelse i Sydøstasien: fra Indien (Assam og Nicobarøerne), Bangladesh og det sydlige Kina til Thailand, Myanmar, Laos, Cambodja, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesien (blandt andet Sumatra, Java, Bali, Borneo og Sulawesi), Brunei, Timor-Leste, Papua Ny Guinea og Filippinerne.

Arten er indført til Florida og til det sydlige Taiwan, hvor den har bredt sig i lavlandet og regnes som invasiv. Disse bestande hører ikke til den oprindelige udbredelse. I sit naturlige område er arten almindelig.

> **Oprindelig udbredelse:** Indien, Bangladesh, Kina, Thailand, Myanmar (Burma), Laos, Cambodja, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesien, Brunei, Timor-Leste, Papua Ny Guinea og Filippinerne.

LEVESTED

Arten lever i primær og sekundær skov, skovkanter, lysninger, plantager og haver i lavlandet. Den lever på jorden i løvlaget, på væltede stammer og klippestykker og klatrer godt. Dyrene er dagaktive og soler sig om morgenen; de jager aktivt og æder leddyr som biller, græshopper, edderkopper og myrer, og af og til snegle og små firben.

Klimaet er tropisk med små udsving i temperaturen året rundt. Aktive dyr har en kropstemperatur på omkring 31-34 °C. Arten tåler kun lidt kulde, og formeringen følger regntiden mere end temperaturen.

Pasning

TERRARIET

Eutropis multifasciata er aktiv og kræver plads. Et enkelt dyr kan holdes i mindst 90 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde), og et par eller en han med to hunner skal have mindst 120 × 60 × 60 cm. Større er bedre. Hold aldrig to hanner sammen: de kan komme i alvorlig strid.

Bunden skal være en løs blanding af jord og kokosfibre på mindst 8 cm, dækket af et lag løv, så dyret kan grave og holde fugten. Indret med kork, grene, flade sten og planter, så der er mindst to skjul og masser af læ. Et fugtigt skjul foret med fugtig sphagnum hører til. Terrariet skal have et tæt låg med god ventilation og en let tilgængelig vandskål.

TEMPERATUR

Terrariet skal have en tydelig gradient. Solpladsen skal være 35-41 °C, målt på overfladen med et infrarødt termometer, og den kølige ende er 27-32 °C. Hanner og hunner, der ikke er drægtige, vælger selv en kropstemperatur på 30-36 °C, mens drægtige hunner foretrækker 28-31 °C, så gradienten skal være bred. Brug to halogenspots i den ene ende over en stor, flad sten. Keramiske varmelegemer og varmemåtter er ikke nok som eneste varmekilde.

Om natten slukkes varmen, og temperaturen må falde til 21-25 °C. Arten tåler kun lidt kulde, så terrariet må aldrig blive koldt, heller ikke om vinteren.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Eutropis multifasciata kræver en høj luftfugtighed på 70-80 %, der gerne falder lidt i løbet af dagen og stiger om natten. Forstøv terrariet grundigt to gange dagligt, og bland vand i bunden. Et lag løv øverst hjælper med at holde fugten. Terrariet må ikke være konstant vådt, for det giver svampeinfektioner.

Hold en mellemstor vandskål med frisk vand fremme, hvor dyret kan drikke og bade. Skift vandet dagligt, og vask skålen hver uge.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

LYS OG UVB

Eutropis multifasciata er dagaktiv og skal have UVB, så længe lyset er tændt. Et T5 HO-rør med 5-6 % UVB i reflektor, der dækker solpladsens side af terrariet, giver Ferguson-zone 3. Zonen er et skøn ud fra levevisen. Placér solpladsen, så dyrets ryg er omkring 20 cm fra røret. UVB trænger ikke gennem glas eller plast, og røret skiftes en gang om året eller efter fabrikantens anvisning.

Supplér med et stærkt, hvidt dagslys, så terrariet er lyst. Lysperioden er 13 timer om sommeren og 11 timer om vinteren.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Eutropis multifasciata æder hovedsageligt insekter. Giv en varieret kost af kakerlakker, fårekyllinger, melorme, silkeorme, sorte soldaterfluelarver, snegle og små græshopper. Giv så meget, som dyret æder på omkring 5 minutter, en gang dagligt; bliver dyret fedt, skæres der ned til hver anden dag.

Banan, papaya og bær kan gives som en lille godbid. Drys insekterne let med kalk, og giv et vitamintilskud en gang om ugen. Hold altid frisk vand fremme.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Eutropis multifasciata er nysgerrig, men sky og hurtig, og den flygter ved forstyrrelse. Hunner kan holdes sammen, og en han kan holdes sammen med to hunner i et stort terrarie med mange skjul; hanner må aldrig holdes sammen. Dyr opdrættet i fangenskab kan blive nogenlunde tamme med tålmodighed, især hvis de fodres fra pincet, men arten egner sig ikke til megen håndtering. Rolige rutiner og mange skjul mindsker stress.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Dyrene er kønsmodne ved omkring 11-12 måneders alder. Sikker kønsbestemmelse af unge dyr kræver en dyrlæge med erfaring i krybdyr.

PARRING

Eutropis multifasciata yngler i naturen i takt med regntiden, men hunnerne i en bestand er ikke synkrone. En kølig hvileperiode er ikke nødvendig, og en egentlig parringssæson i terrarier er ikke dokumenteret. En han med to hunner i et stort terrarie med mange skjul fungerer.

ÆGLÆGNING OG KULD

Eutropis multifasciata føder levende unger: æggene udvikles i hunnen, og ungerne kommer færdige til verden. Et kuld er på 2-10 unger, typisk 4-6. Hvor mange kuld hunnen får om året, er ikke dokumenteret.

INKUBATION

Der er ingen æg at udruge. Drægtighedens længde er ikke dokumenteret; 60-90 dage i boksen er et skøn. Drægtige hunner søger køligere, omkring 29 °C, og bliver langsommere, så de skal kunne finde en plads på 28-30 °C og have ro. Giv hunnen ekstra føde, kalk og UVB, og hold terrariet roligt med mange skjul.

OPDRÆT AF UNGER

Ungerne er omkring 4 cm fra snude til kloak ved fødslen. Opdræt dem i et terrarie med løv, skjul, UVB og høj luftfugtighed, og giv dem små insekter dagligt, drysset med kalk. Skil ungerne fra de voksne, hvis hannen er tæt på.

Sundhed og typiske fejl

Eutropis multifasciata er hårdfør, når temperatur, lys og fugt er rigtige. De typiske problemer er:

- Kalkmangel og knogleskørhed ved for lidt UVB og ensidig kost.
- Svampeinfektion og hudproblemer ved konstant vådt underlag eller dårlig ventilation.
- Fedme ved for meget føde og lidt bevægelse.
- Indvendige og udvendige parasitter, især hos vildfangne dyr.
- Kampskader mellem hanner og stress ved for lidt gemmesteder.

Sæt nye dyr i karantæne i mindst en måned. Dyrene skjuler sygdom godt, så kontakt en dyrlæge med erfaring i krybdyr ved ændret appetit, vægttab eller hævelser.

Læs mere: Karantæne og hygiejne Læs mere: Køb af dyr: opdræt, vildfang og transport

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.