herpy

SKINKER

Emerald Skink

Lamprolepis smaragdina

Lamprolepis smaragdina er en slank, dagaktiv skink, der lever i træerne på øerne i det sydøstlige Asien og det vestlige Stillehav. Den er som regel smaragdgrøn med brune, hvidprikkede bagben og bruger det meste af tiden på stammer og grene. I terrariet skal den have højde, varme, kraftig UVB og høj luftfugtighed, og den egner sig bedst som udstillingsdyr.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Dasia smaragdina; Lygosoma smaragdinum* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**7-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**33-36 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**9-13 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**69-100 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et enkelt voksent *Lamprolepis smaragdina* skal have et terrarie på mindst 60 × 45 × 90 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre, især i højden. Arten er trælevende, så højden er vigtigere end gulvarealet.

TEMPERATUR

Solpladsen for *Lamprolepis smaragdina* skal være omkring 35 °C, målt på selve grenen med en digital følerprobe. Den kølige side skal være 24-29 °C, og om natten skal temperaturen være 20-25 °C. Varmekilden slukkes om natten.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden i terrariet til *Lamprolepis smaragdina* skal være omkring 70 % om dagen og stige mod 100 % om natten. Sprøjt terrariet morgen og aften, helst når det er mørkt, og gerne let igen om eftermiddagen.

LYS OG UVB

Lamprolepis smaragdina er dagaktiv og lever i solbeskinnede træer, så arten har brug for kraftig UVB og stærkt lys.

FODER

Lamprolepis smaragdina er først og fremmest insektæder, men tager lidt frugt og blomster. Grundfoderet kan være fårekyllinger, kakerlakker (fx *Blaptica dubia*), græshopper og andre varierede insekter.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Lamprolepis smaragdina er hurtig og sky og bedre som udstillingsdyr end som dyr til håndtering. Et nyt dyr skal have mindst to uger i fred. Spiser det ikke efter den tid, bør det til dyrlæge, før det håndteres.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Filippinerne, Indonesien, Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Mikronesien, Marshalløerne, Palau og Timor-Leste.