herpy

SKINKER

## Emerald Skink

# *Lamprolepis smaragdina*

*Lamprolepis smaragdina* er en slank, dagaktiv skink, der lever i træerne på øerne i det sydøstlige Asien og det vestlige Stillehav. Den er som regel smaragdgrøn med brune, hvidprikkede bagben og bruger det meste af tiden på stammer og grene. I terrariet skal den have højde, varme, kraftig UVB og høj luftfugtighed, og den egner sig bedst som udstillingsdyr.

Familie: Scincidae  Tidligere navn: *Dasia smaragdina; Lygosoma smaragdinum*  Udgivet 16. november 2026

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **20-25 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **7-12 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende** |
| Biotop | **Regnskov** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 45 × 90 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **24-29 °C** |
| Hotspot | **33-36 °C** |
| Temperatur, nat | **20-25 °C** |
| Luftfugtighed | **70-100 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 2 |
| Kost | **Insekter, frugt og færdigfoder** |
| Holdes | **Enkeltvis eller i gruppe** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **9-13 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **1-2 æg** |
| Inkubation | **69-100 dage**<br>ved 26-29 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten er ikke opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

## Om arten

*Lamprolepis smaragdina* er en slank skink med spidst hoved, lange tæer og glatte, runde skæl. Grundfarven er skinnende grøn, ofte med brune bagben, der er plettet med hvidt, og gule øjenlåg om de sorte øjne. Farven varierer meget: nogle dyr er sortprikkede, delvis brune eller helt brune, og på enkelte øer findes næsten blå dyr. Undersiden er lysere. Halen er op til halvanden gang så lang som kroppen og kan afkastes, hvis dyret bliver grebet.

Arten bliver 20-25 cm inklusive hale, og kroppen fra snude til kloak er op til 12 cm. Hannerne er territoriale og forsvarer et område med flere hunner. Både ved forsvar af territoriet og ved frieri nikker hannerne med hovedet.

Navnet smaragdina betyder smaragdgrøn på latin og peger på farven. Slægtsnavnet *Lamprolepis* kommer formentlig af det græske ord for skinnende og ordet for skæl, og det passer på de glatte, blanke skæl. *L. smaragdina* er let at kende, men den er opdelt i flere underarter og lokale former, som i handlen går under samme navn. De mest forskellige bestande lever på Sulawesi. Arten er sky og hurtig og bedst som et dyr, man ser på, ikke et dyr, man håndterer.

# Udbredelse og levested

*Lamprolepis smaragdina* har et meget stort udbredelsesområde. Den findes på Filippinerne, store dele af Indonesien (fra Lombok og Sulawesi til Molukkerne og Ny Guinea), Timor-Leste, Bismarckøerne og Admiralitetsøerne, Salomonøerne (til og med Santa Cruz-øerne) og videre ud over Palau og Carolinerne i Mikronesien til Marshalløerne. Arten har spredt sig over havet til selv meget små øer, og bestandene på de fjerne Stillehavsøer er de yngste. På Saipan i Nordmarianerne er den indført.

> **Oprindelig udbredelse:** Filippinerne, Indonesien, Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Mikronesien, Marshalløerne, Palau og Timor-Leste.

### LEVESTED

*Lamprolepis smaragdina* er knyttet til træer. Den findes i skov med åbent kronetag i lavlandet, i mangrove, i kokosplantager og i træer i haver og parker, og den tilbringer næsten hele livet på stammer og grene. Arten foretrækker bare stammer uden slyngplanter og er almindelig i forstyrret, kystnært landskab, ofte i palmeplantager.

Klimaet er tropisk med varme, fugtige døgn. Om dagen soler dyret sig på lyse stammer og grene og holder en kropstemperatur på omkring 30 °C, mens det jager insekter i løv og på bark. Føden er mest leddyr, af og til små gekkoer og skinker, og lidt frugt.

# Pasning

### TERRARIET

Et enkelt voksent *Lamprolepis smaragdina* skal have et terrarie på mindst 60 × 45 × 90 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre, især i højden. Arten er trælevende, så højden er vigtigere end gulvarealet. Et terrarie med frontåbning, der er uigennemsigtigt på alle sider undtagen fronten, er roligere for dyret og lettere at komme til. Ventilationen skal være god, så luften ikke bliver stillestående og muggen.

Bunden skal først og fremmest holde på fugten og dæmpe et fald. Brug et lag på 5-10 cm fugtig kokosfiber eller sphagnum, evt. med et lag blade ovenpå, og skift bunden helt mindst en gang om måneden, hvis den ikke er bioaktiv. En bioaktiv bund kræver et tykkere lag og levende planter.

Indret terrariet med mange grene, kork og lianer i alle højder, så dyret kan klatre og regulere temperaturen. En kraftig gren under varmekilden er solplads. Giftfri tropiske planter som pothos, philodendron og bromelier giver dækning og hjælper på luftfugtigheden. Hanner og hunner skal kun holdes sammen, hvis der skal yngles.

Læs mere: Varme og temperatur Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation Læs mere: Terrarieopbygning og bioaktiv bund

### TEMPERATUR

Solpladsen for *Lamprolepis smaragdina* skal være omkring 35 °C, målt på selve grenen med en digital følerprobe. Den kølige side skal være 24-29 °C, og om natten skal temperaturen være 20-25 °C. Varmekilden slukkes om natten. Den varmeste zone er øverst under lampen, og den køligste nederst, så der skal være klatremateriale i alle højder.

En halogenlampe eller en varmepære på 60 W i en lampe med keramisk fatning er normalt nok til ét dyr; en dæmper eller termostat holder solpladsen på rette niveau. Er solpladsen for varm, så skift til en svagere pære, og er den for kold, kræves en stærkere. Keramiske varmelegemer og farvede pærer er mindre egnede, fordi en dagaktiv skink har brug for lys og strålevarme.

### LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden i terrariet til *Lamprolepis smaragdina* skal være omkring 70 % om dagen og stige mod 100 % om natten. Sprøjt terrariet morgen og aften, helst når det er mørkt, og gerne let igen om eftermiddagen. Et automatisk regnanlæg gør det meget lettere i et så højt terrarie, og dyret drikker de dråber, der sidder på blade og grene.

Mål med en digital hygrometerprobe midt i terrariet. For lav fugtighed giver sundhedsproblemer, men det samme gør for dårlig ventilation, så terrariet skal kunne tørre lidt op mellem sprøjtningerne. Bruges en forstøver, skal den køre med destilleret vand og kun om natten og rengøres jævnligt. Stil desuden en lav skål med rent vand ved fodringsstedet. Skift vandet dagligt, og skrub skålen hver uge.

### LYS OG UVB

*Lamprolepis smaragdina* er dagaktiv og lever i solbeskinnede træer, så arten har brug for kraftig UVB og stærkt lys. Brug et T5-rør på 6 % (Ferguson-zone 2) i en reflekterende armatur, der dækker det meste af terrariets længde, og sæt solpladsen 20-30 cm under røret. Til lave terrarier er et kompakt rør tæt på solpladsen at foretrække. UV-indekset skal være 2-3 på solpladsen. Mål med en UV-måler, og skift røret hver 12. måned.

UVB blokeres af glas og plast, så et vindue giver ingen UVB. Tilføj et kraftigt hvidt lys på omkring 6500 K, fx et T5 HO-rør eller en LED-bjælke, især hvis der er levende planter. Lyset skal være tændt 11-13 timer i døgnet og følge årstiden.

Læs mere: Lys og UVB

### FODER

*Lamprolepis smaragdina* er først og fremmest insektæder, men tager lidt frugt og blomster. Grundfoderet kan være fårekyllinger, kakerlakker (fx *Blaptica dubia*), græshopper og andre varierede insekter. Et lille fad med frugtfoder til trælevende gekkoer kan tilbydes en gang om ugen. Variation er vigtig.

Unge dyr fodres hver dag, voksne hver anden dag. Giv så mange insekter, som dyret æder på fem minutter, gerne fra en pincet med bløde spidser. Byttedyrene må højst være lidt mindre end dyrets hoved. Fodr byttedyrene op med næringsrigt foder i to-tre dage inden. Drys dem let med en blanding af kalk og multivitamin ved hver fodring. Drikkevand fås fra sprøjtningen, men en skål med rent vand skal altid stå fremme.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

### ADFÆRD OG HÅNDTERING

*Lamprolepis smaragdina* er hurtig og sky og bedre som udstillingsdyr end som dyr til håndtering. Et nyt dyr skal have mindst to uger i fred. Spiser det ikke efter den tid, bør det til dyrlæge, før det håndteres. Vænn det til at tage insekter fra en pincet, og lad det selv gå op på en hånd eller arm, hvis det skal flyttes. Tag aldrig fat ovenfra, for det opfattes som et rovdyrangreb, og dyret kan afkaste halen.

Arten kan holdes enkeltvis eller i grupper i et tilsvarende større terrarie. Hanner er territoriale og skal ikke holdes sammen med andre hanner. Har dyrene ikke plads nok til at gå af vejen for hinanden, bliver der konflikter.

## Avl

### KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

*Lamprolepis smaragdina* bliver kønsmoden efter 9-13 måneder. Kønsforskellene er små: hannerne er territoriale og kan kendes på adfærden, og en moden han er som regel kraftigere bygget end hunnen. Sikker kønsbestemmelse kræver en dyrlæge med erfaring i krybdyr.

### PARRING

Avl af *Lamprolepis smaragdina* i terrarier er kun sparsomt beskrevet. En han og en eller flere hunner holdes sammen i et stort, højt terrarie med mange skjul og klatremuligheder, så hunnerne kan gå af vejen for hannen. Hannen nikker med hovedet under frieriet. Hold hannerne adskilt, da de forsvarer territorium.

### ÆGLÆGNING OG KULD

*Lamprolepis smaragdina* lægger æg, normalt 1-2 ad gangen. Hunnen lægger dem under løs bark, så terrariet skal have løse korkflader og en æglægningskasse med fugtig, løs jord eller mos. Hvor mange lægninger hunnen har om året, er ikke dokumenteret. Hold øje med hunnens vægt og kalkindtag i æglægningsperioden.

### INKUBATION

Æggene klækker efter 69-100 dage. Tag dem forsigtigt ud, uden at vende dem, og læg dem halvt nedgravet i fugtig vermiculite eller tørvemos i en let ventileret beholder. Temperaturen er ikke dokumenteret for arten; 26-29 °C passer til tropiske, trælevende skinker og er et skøn. Mosset skal være fugtigt, men ikke vådt.

### OPDRÆT AF UNGER

Ungerne ligner de voksne i farven og fodres som voksne, men i mindre størrelse og hver dag. Giv små fårekyllinger, springhaler og andre små insekter, og drys foderet med kalk og D3-vitamin. Hold ungerne i et lille, højt terrarie med samme temperatur og fugtighed og UVB som de voksne. Hold dem adskilt fra voksne dyr, hvis der ikke er plads nok.

## Sundhed og typiske fejl

Der findes kun lidt specifik viden om sygdomme hos arten. Typiske problemer og forebyggelse:

- Knoglesvind og svaghed ved mangel på UVB, kalk og D3-vitamin. Brug kraftig UVB, skift røret hver 12. måned, og drys foderet med kalk og multivitamin.
- Luftvejsproblemer og hudproblemer ved stillestående, for fugtig luft uden ventilation. Sørg for god ventilation og et tørt tidsrum mellem sprøjtningerne.
- Udtørring ved for lav luftfugtighed. Matte øjne og slap krop er tegn på for lidt fugt.
- Parasitter hos nyindkøbte dyr, især vildfangne. Hold nye dyr i karantæne og få en afføringsprøve undersøgt hos en dyrlæge med erfaring i krybdyr.
- Tabt hale ved forskrækkelse eller forkert håndtering. Halen vokser kun delvis tilbage.

Et sundt dyr er årvågent, har klare øjne og en fast, afrundet krop. Søg dyrlæge, hvis dyret taber sig, ikke æder eller ligger sløvt hen.

Læs mere: Karantæne og hygiejne Læs mere: Køb af dyr: opdræt, vildfang og transport

### Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.