herpy

SKINKER

Southern White's Skink

Liopholis whitii

En mellemstor, dagaktiv klippeskink fra det køligt tempererede sydlige Australien og Tasmanien. *Liopholis whitii* bor i klippesprækker og gange under sten, lever i små familiegrupper og føder levende unger. Den kræver et terrarie med mange smalle skjul, en varm solplads, en kølig nat og tålmodighed ved sammensætningen af dyr.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Egernia whitii; Scincus whitii*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og gravende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-26 °C**
Hotspot	**30-35 °C**
Temperatur, nat	**12-18 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-4 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**100-140 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står sandsynligvis på CITES liste III (Australien, som *Egernia* spp.) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr; det er ikke bekræftet, om listeføringen dækker den slægt, arten nu hører til. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Liopholis whitii*. Et enkelt dyr kan holdes i 60 × 30 × 40 cm.
TEMPERATUR	Om dagen skal luften være 20-26 °C, og under en lampe i den ene ende skal en flad sten nå 30-35 °C målt med et infrarødt termometer. Om natten skal temperaturen falde til 12-18 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 40-60 %. Hold bunden tør, men gør en del af bunden let fugtig under en sten eller et stykke bark, så dyrene kan vælge. Forstøv ikke dagligt.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig på sten. Et UVB-rør i reflektor over solpladsen skal give UVB svarende til Ferguson-zone 2. Afstanden fra røret til solpladsen afhænger af lampens styrke, så følg producentens anvisning.
FODER	*Liopholis whitii* er altædende. Giv insekter som melorme, fårekyllinger og kakerlakker, og supplér med finthakkede urter og lidt frugt eller bær. Voksne dyr fodres tre gange om ugen, gerne med melorme og frugtpuré.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er territorial over for fremmede og lever i naturen i små familiegrupper, der kender hinanden. Dyr, der er vokset op sammen, kan holdes sammen; fremmede voksne skal ikke lægges sammen, for de bider og kan såre hinanden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.