herpy

SKINKER

Banded Lipinia

Lipinia microcerca

Lipinia microcerca er en lille, dagaktiv skink fra Vietnam, Cambodja og det sydlige Laos. Den lever på stammerne af store træer i lys skov og ved landsbyer og jager myrer og andre små insekter. Den bliver 8-9 cm inklusive den orange hale og er hurtig og sky.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Lipinia vittigera microcerca; Lygosoma microcercum*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-9 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**3-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**32 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-4 æg**
Inkubation	**50-70 dage** ved 23-25 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Arten er ikke opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Lipinia microcerca*. Dag- og nattemperatur, fugt og avl bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på andre små, trælevende skinker, og de tal er skøn.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 25-28 °C, og en lille varmeplads på en stamme under en svag varmepære skal nå 32 °C, målt på overfladen. Om natten slukkes varmen, og temperaturen falder til 20-23 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 60-80 %, højest om natten og lige efter forstøvning. Arten lever i lysere skov med en tørtid, så den skal have lidt tørrere luft end *Lipinia vittigera*.
LYS OG UVB	*Lipinia microcerca* er dagaktiv og færdes på stammer i skov, hvor solen falder filtreret ned.
FODER	*Lipinia microcerca* æder bananfluer, små fårekyllinger, buffaloorme, små biller og andre insekter i samme størrelse. I naturen er føden edderkopper og små insekter, blandt andet myrer.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Lipinia microcerca* er hurtig og sky og er et dyr, man ser på, ikke et dyr, man håndterer. Den kan smide halen, og den nye hale ligner ikke den oprindelige.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Vietnam, Cambodja og Laos.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/skinker/lipinia-microcerca