herpy

SKINKER

## Banded Lipinia

# *Lipinia microcerca*

*Lipinia microcerca* er en lille, dagaktiv skink fra Vietnam, Cambodja og det sydlige Laos. Den lever på stammerne af store træer i lys skov og ved landsbyer og jager myrer og andre små insekter. Den bliver 8-9 cm inklusive den orange hale og er hurtig og sky.

Familie: Scincidae  Tidligere navn: *Lipinia vittigera microcerca; Lygosoma microcercum*

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **8-9 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **3-5 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende** |
| Biotop | **Regnskov** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **45 × 45 × 60 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **25-28 °C** |
| Hotspot | **32 °C** |
| Temperatur, nat | **20-23 °C** |
| Luftfugtighed | **60-80 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Anbefalet**<br>Ferguson-zone 2 |
| Kost | **Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis eller i gruppe** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **12 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **2-4 æg** |
| Inkubation | **50-70 dage**<br>ved 23-25 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke vurderet (NE)** |

Arten er ikke opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

## Om arten

*Lipinia microcerca* er en lille, slank og glatskællet skink. Kroppen måler højst 4 cm fra snude til kloak, og halen er lige så lang eller lidt længere, så voksne dyr bliver 8-9 cm i alt. Ryggen har en tynd, lys midterstribe fra snudespidsen til halens rod med en mørk stribe på hver side og en lys stribe længere ude. Langs flankerne løber et bredt, mørkt bånd og under det endnu en lys stribe. Halen er rødlig til klart orange. Det nederste øjenlåg har et stort, gennemsigtigt vindue, og øreåbningen er synlig.

Arten blev beskrevet i 1901 og blev længe regnet for en underart af *Lipinia vittigera*. En revision af artskomplekset i 2019 viste, at *L. microcerca* er en selvstændig art, og at *Lipinia vittigera* i snæver forstand kun lever syd for Kra-tangen og i Sundaland. I Indokina lever desuden de nærtstående og meget lignende *Lipinia trivittata* og *Lipinia vassilievi*. Dyr fra Indokina kan stadig stå som *L. vittigera* i ældre litteratur og i handlen. Artsnavnet betyder "kort hale" og henviser til, at halen er kort i forhold til andre skinker i samme gruppe.

# Udbredelse og levested

*Lipinia microcerca* er sikkert kendt fra det centrale og sydlige Vietnam, Cambodja og det yderste syd i Laos. Den lever formentlig også i Thailand nord for Kra-tangen og i det østlige og sydlige Myanmar, men fundene derfra er ikke endeligt artsbestemt, fordi artskomplekset først for nylig er delt op. Kortet viser kun de sikre lande. Arten findes i lavland, bakkeland og på de lavere bjergskråninger op til omkring 1.200 m.

> **Oprindelig udbredelse:** Vietnam, Cambodja og Laos.

### LEVESTED

*Lipinia microcerca* lever i skov, også lys og åben regnskov, både uforstyrret og forstyrret, og i landsbyer og ved huse, og den kan være ret almindelig lokalt. Den er trælevende og jager om dagen på stammerne af store træer og af og til på væggene af træhuse i eller ved skoven, op til mindst 5 m over jorden. Dyrene går kun kortvarigt ned på jorden for at krydse fra stamme til stamme.

Arten er aktiv ved temperaturer over 20 °C og gemmer sig under bark eller i små hulrum i træerne på regnvejrsdage. Føden er edderkopper og små insekter, blandt andet myrer. Dyrene ses alene eller 2-3 sammen på samme stamme, og de vifter ofte med den farvede hale som signal. Klimaet er tropisk med en regntid og en tørtid. Ungerne klækker i regntiden, og hudskifte ses især i januar.

# Pasning

### TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Lipinia microcerca*. Dag- og nattemperatur, fugt og avl bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på andre små, trælevende skinker, og de tal er skøn.

Et par eller en lille gruppe skal have et højt terrarie på mindst 45 × 45 × 60 cm, og flere dyr kræver mere plads og flere varmepladser og skjul. Arten klatrer som en daggekko på grene, bark og ru flader, men kan ikke gå på glas. Bag- og sidevægge skal derfor være ru, fx af kork, og terrariet indrettes med tyk korkbark stillet lodret og skrå grene i alle højder, så hele højden bliver udnyttet. Smalle spalter bag og under barken er gode skjul på kølige og fugtige dage.

Bunden er et fugtholdigt lag af jord og kokosfibre med blade ovenpå. Giftfri tropiske planter giver dækning og holder på fugten.

*Lipinia microcerca* kan slippe ud gennem sprækker på bare 2 mm. Terrariet skal derfor være helt tæt: låger, ventilationsnet og kabelgennemføringer må ikke have sprækker over 1-2 mm.

### TEMPERATUR

Om dagen skal der være 25-28 °C, og en lille varmeplads på en stamme under en svag varmepære skal nå 32 °C, målt på overfladen. Om natten slukkes varmen, og temperaturen falder til 20-23 °C. Dyret er aktivt fra omkring 20 °C og tåler ikke overophedning, så der skal altid være en køligere zone nederst i terrariet. Brug en varmepære med lav effekt på termostat.

Læs mere: Varme og temperatur

### LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være 60-80 %, højest om natten og lige efter forstøvning. Arten lever i lysere skov med en tørtid, så den skal have lidt tørrere luft end *Lipinia vittigera*. Forstøv let hver morgen, så bark og planter er fugtige, og lad terrariet tørre lidt op i løbet af dagen. Dyrene drikker dråber fra blade og bark, og en lille, lav skål med frisk vand kan stå fremme som supplement. Skift vandet dagligt. God ventilation er nødvendig, så luften ikke bliver stillestående.

Læs mere: Luftfugtighed, forstøvning og ventilation

### LYS OG UVB

*Lipinia microcerca* er dagaktiv og færdes på stammer i skov, hvor solen falder filtreret ned. Den skal have UVB svarende til Ferguson-zone 2: et svagt UVB-rør til skovarter, så UV-indekset på varmepladsen er omkring 1-2, målt med en UV-måler. Lad lyset dække kun en del af terrariet, så dyret selv kan vælge skygge, og skift røret hver 12. måned. Lyset skal være tændt 12 timer i døgnet.

Læs mere: Lys og UVB

### FODER

*Lipinia microcerca* æder bananfluer, små fårekyllinger, buffaloorme, små biller og andre insekter i samme størrelse. I naturen er føden edderkopper og små insekter, blandt andet myrer. Variér foderet, og fodr byttedyrene op med næringsrigt foder et par dage før. Voksne dyr fodres hver anden dag og unge dyr hver dag, med så meget, som de æder på 5-10 minutter. Drys foderet med kalk ved de fleste fodringer og med et vitaminpræparat med D3 hver anden uge.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

### ADFÆRD OG HÅNDTERING

*Lipinia microcerca* er hurtig og sky og er et dyr, man ser på, ikke et dyr, man håndterer. Den kan smide halen, og den nye hale ligner ikke den oprindelige. Arten kan holdes i grupper, og i naturen ses dyrene ofte 2-3 sammen på samme stamme. Giv en gruppe flere varmepladser, skjul og foderpladser, og hold øje med bid og stress. Et nyt dyr skal have et par uger i fred i et terrarie med mange skjul.

## Avl

### KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Dyrene bliver kønsmodne ved udgangen af det første leveår. Kønsforskelle er ikke beskrevet, så kønnet kan ikke afgøres sikkert ud fra udseendet.

### PARRING

Parringen er ikke beskrevet. Ungerne klækker i regntiden. Om en køligere og tørrere periode om vinteren fremmer avlen, er ikke undersøgt. Et par eller en gruppe kan gå sammen hele året.

### ÆGLÆGNING OG KULD

Hunnen lægger 2-4 æg i et kuld. Hvor mange kuld der kommer om året, er ikke dokumenteret. Æggene lægges gerne skjult i terrariet, fx i et stykke kork, hvor de sidder så fast, at de ikke kan tages ud uden at gå i stykker. De kan blive liggende og klække i terrariet.

### INKUBATION

Æggene udvikler sig ved omkring 23-25 °C og klækker også i terrariet, når de ligger skjult i kork. Rugetiden er ikke dokumenteret; 50-70 dage i boksen er et skøn ud fra andre små, tropiske skinker. De nyklækkede unger er omkring 4 cm lange.

### OPDRÆT AF UNGER

Nyklækkede unger er omkring 4 cm lange og kan fra starten æde springhaler og små bananfluer. Hold dem i et lille, højt og helt tæt terrarie med samme temperatur og fugt som de voksne og mange skjul. Fodr dem hver dag, og drys foderet med kalk.

## Sundhed og typiske fejl

Der findes ingen dokumenteret viden om sygdomme hos *Lipinia microcerca*. Typiske problemer hos små, insektædende skinker er kalkmangel ved for lidt UVB, kalk og D3, udtørring ved for lav luftfugtighed, parasitter hos nye dyr og stress ved for tæt hold.

Vildfangne dyr er ofte svækkede og bærer parasitter. Hold nye dyr i karantæne i mindst en måned, og få en afføringsprøve undersøgt. Kontakt en dyrlæge med erfaring i krybdyr ved nedsat appetit, vægttab eller hævelser. Levetiden er ikke dokumenteret; 3-5 år er et skøn for så små skinker.

Læs mere: Karantæne og hygiejne Læs mere: Køb af dyr: opdræt, vildfang og transport

### Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.