herpy

SKINKER

Banded Lipinia

Lipinia vittigera

Lipinia vittigera er en lille, dagaktiv skink, der lever på stammerne af store træer i regnskoven på den sydlige del af Malaysia-halvøen, Sumatra og Borneo. Den bliver omkring 8 cm og kendes på et bredt, lyst bånd langs ryggen mellem to mørke striber.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Lygosoma vittigerum*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-9 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**3-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-3 æg**
Inkubation	**50-70 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Lipinia vittigera*. Pasningen bygger på klimaet og levestedet, på den nære slægtning *Lipinia microcerca* og på *Lamprolepis smaragdina*, en større, trælevende skink fra samme område.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 25-28 °C og på en varmeplads øverst på en stamme 30-32 °C, målt på overfladen; *Lipinia microcerca* trives med 32 °C på varmepladsen. Om natten slukkes varmen, og temperaturen falder til 22-24 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 70-90 %, lavest om dagen og højest om natten. Det er lidt fugtigere end for *Lipinia microcerca*, der lever i lysere skov med en tørtid.
LYS OG UVB	*Lipinia vittigera* er dagaktiv, men lever på skyggede stammer i skov, så et lavt UV-indeks passer: omkring 1-2 på varmepladsen, svarende til Ferguson-zone 2.
FODER	*Lipinia vittigera* æder edderkopper og små insekter, blandt andet myrer, som den fanger på stammer og bark.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Lipinia vittigera* er hurtig og sky og er et dyr, man ser på, ikke et dyr, man håndterer. Et nyt dyr skal have mindst to uger i fred i et terrarie med mange skjul.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Thailand, Malaysia, Singapore og Indonesien.