herpy

SKINKER

African fire skink

Mochlus fernandi

En kraftig, hurtig skink fra de vestafrikanske skove med stærkt rødorange sider, sorte og hvide tværbånd og bronzefarvet ryg. *Mochlus fernandi* graver sig ned i fugtig bund, kræver varme, UVB og en fugtig bund og kan blive 15-20 år.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Lepidothyris fernandi; Lygosoma fernandi; Riopa fernandi; Tiliqua fernandi*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-38 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**50-100 g**
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**33-36 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-9 æg**
Kuld pr. år	**3-5**
Inkubation	**55-65 dage** ved 30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført i CITES eller i EU's bilag A-D, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen skinker står på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET

Mochlus fernandi lever på jorden og graver, så gulvarealet og bunden er det vigtigste. Et enkelt dyr kan holdes i 90 × 45 × 45 cm, mens et par skal have mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde).

TEMPERATUR

Terrariet skal have en tydelig gradient. Om dagen skal der være 25-30 °C, og ved solpladsen skal overfladen nå 33-36 °C, målt med et infrarødt termometer. Den kølige ende skal ligge omkring 24-26 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Arten kræver høj luftfugtighed i bunden: 60-70 % omkring dyrets skjul, mens overfladen i den varme ende gerne må være tørrere, ned til omkring 40 %.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og hører til Ferguson-zone 2: den soler sig lidt og kræver moderat UVB. UV-indekset skal være omkring 3 på solpladsen og lavere i resten af terrariet.

FODER

Mochlus fernandi er insektæder. Basisfoderet er fårekyllinger, suppleret med kakerlakker, melorme, silkeorme, snegle og andre insekter af passende størrelse. Byttet må ikke være større end dyrets hoved.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er hurtig, glat og lidt sky. Et nyt dyr skal have ro i mindst to uger, før det håndteres, og løftes forsigtigt nedefra i et lukket rum, så det ikke slipper væk. De fleste dyr holdes bedst enkeltvis.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Sierra Leone, Guinea, Liberia, Elfenbenskysten, Ghana, Nigeria, Cameroun, Ækvatorialguinea, Gabon og Congo-Brazzaville.