herpy

SKINKER

## American Five-lined Skink

# *Plestiodon fasciatus*

*Plestiodon fasciatus* er en slank, blankskællet skink fra skove og skovbryn i det østlige Nordamerika. Arten bliver 13-21 cm, ungerne er sorte med fem lyse striber og en lysende blå hale, og hannen får rødt hoved i parringstiden. Den lever af insekter og edderkopper, kræver sol og en kold vinterhvile, og hunnen bevogter sine æg.

Familie: Scincidae  Tidligere navn: *Eumeces fasciatus*

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **13-21 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **4-6 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende og jordboende** |
| Biotop | **Tempereret skov og eng** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **90 × 45 × 45 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **24-30 °C** |
| Hotspot | **34-38 °C** |
| Temperatur, nat | **15-20 °C** |
| Luftfugtighed | **60-80 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Anbefalet**<br>Ferguson-zone 2 |
| Vinterhvile | **5-10 °C**<br>8-16 uger |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Parvis eller 1 han med flere hunner** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **21-36 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **5-18 æg** |
| Kuld pr. år | **1** |
| Inkubation | **22-32 dage**<br>ved 27-30 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten står hverken på CITES eller i EU's bilag A-D, og ingen skinke er forbudt at holde for private efter BEK nr. 1261 af 17.11.2015.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasning af *Plestiodon fasciatus* i fangenskab. Anbefalingerne her bygger på artens levested, foretrukne temperatur og biologi. |
| **TEMPERATUR** | *Plestiodon fasciatus* vælger selv temperatur mellem 28 og 36 °C og tåler kortvarigt op til 42 °C. Dagtemperaturen i terrariet skal være 24-30 °C, og solpladsen 34-38 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | *Plestiodon fasciatus* foretrækker fugtigere levesteder end de fleste andre arter i slægten, tåler ikke for tørre forhold og lever altid nær permanent vand. |
| **LYS OG UVB** | *Plestiodon fasciatus* er dagaktiv og soler sig, især om morgenen. Arten lever i skovbryn og lysninger og har brug for kraftigt lys og UVB. |
| **FODER** | *Plestiodon fasciatus* er rent kødædende og lever af leddyr. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Plestiodon fasciatus* er hurtig og sky og gemmer sig under bark og sten ved forstyrrelse. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | USA og Canada. |