herpy

SKINKER

Peters' Banded Skink

Scincopus fasciatus

En kraftig, nataktiv gravende skink fra Saharas kanter, gul til orange med brede sorte tværbånd. *Scincopus fasciatus* graver faste gange i sandet jord, æder insekter og bliver 20-25 cm lang. Den kræver en dyb, sandet bund, en varm solplads, et mørkt skjul og en tør luft.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Scincus fasciatus; Cyclodus brandtii*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Ørken, halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Hotspot	**35-38 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**20-45 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-5 æg**
Inkubation	**50-70 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Scincopus fasciatus*, og inkubation og levetid er lånt fra den beslægtede *Scincus scincus*. Et enkelt dyr skal have mindst 90 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde).

TEMPERATUR

Om dagen skal luften være 27-30 °C, og under en varmelampe skal et skjul eller en flad sten nå 35-38 °C målt med et infrarødt termometer. Sæt en termostat på varmen. Om natten skal temperaturen være 20-25 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være lav, 20-45 %, med god ventilation. Giv et fugtigt skjul på den kølige side, hvor bunden under et stykke bark eller sten holdes fugtig; det hjælper ved hudskifte.

LYS OG UVB

Scincopus fasciatus er nataktiv, men svagt UVB (Ferguson-zone 1) anbefales. Brug et UVB-rør i reflektor over solpladsen og lad dyret kunne trække sig tilbage i skygge.

FODER

Scincopus fasciatus æder mest insekter som kakerlakker, fårekyllinger, melorme, silkeorme og larver af den sorte soldaterflue. Lidt grønt og frugt kan tilbydes som tillæg. Foderdyrene må ikke være større end dyrets hoved.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er rolig og tåler håndtering, men er mest aktiv om natten og tilbringer dagen under jorden. Ved nye dyr er det bedst at lade dem være i fred i to til tre uger, indtil de æder jævnt.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Marokko, Algeriet, Tunesien, Vestsahara, Mauretanien, Mali, Niger, Tchad, Sudan, Sydsudan og Libyen.