herpy

SKINKER

Peters' Banded Skink

Scincopus fasciatus

En kraftig, nataktiv gravende skink fra Saharas kanter, gul til orange med brede sorte tværbånd. *Scincopus fasciatus* graver faste gange i sandet jord, æder insekter og bliver 20-25 cm lang. Den kræver en dyb, sandet bund, en varm solplads, et mørkt skjul og en tør luft.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Scincus fasciatus; Cyclodus brandtii*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Ørken, halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Hotspot	**35-38 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**20-45 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-5 æg**
Inkubation	**50-70 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Om arten

Scincopus fasciatus er en tungt bygget, kraftig skink med et stort, kegleformet hoved, store øjne med lodret ovale pupiller, korte, kraftige ben og en kort, tilspidsende hale. Skællene er tykke og adskilt af dybe furer, og to store trekantede flige dækker ørehullet. Grundfarven er gul til orange med syv eller otte brede, sorte tværbånd fra nakken til halespidsen og en lysere bug.

Voksne dyr er 20-25 cm i alt med den korte hale. Arten ligner *Scincus scincus*, men er langt kraftigere og har kun svagt kantede tæer; den svømmer ikke gennem sandet, men graver faste gange. To underarter er beskrevet: *S. f. fasciatus* og *S. f. melanocephalus* fra Sudans kyst ved Det Røde Hav.

Arten er nataktiv og stille og tåler håndtering. Dyrene i handlen er næsten alle vildfangede, og kun få avlsforsøg er beskrevet.

Læs mere: Køb af dyr: opdræt, vildfang og transport

Udbredelse og levested

Scincopus fasciatus findes i det nordlige Afrika: Marokko, Algeriet, Tunesien, Vestsahara, Mauretanien, Mali, Niger, Tchad, Libyen, Sudan og Sydsudan. Arten lever i og omkring Sahara, især på den nordlige og sydlige kant af ørkenen. Bestanden er ikke vurderet som truet.

> **Oprindelig udbredelse:** Marokko, Algeriet, Tunesien, Vestsahara, Mauretanien, Mali, Niger, Tchad, Sudan, Sydsudan og Libyen.

LEVESTED

Arten lever i tørre til halvtørre områder med sandet, til tider stenet jord, spredt ørkenvegetation, savanne, krat og græsland. Den graver faste gange, som den bruger igen og igen, og jager insekter om natten. Føden er insekter, og i fangenskab æder den også lidt planteføde. Biologien er kun lidt kendt.

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Scincopus fasciatus*, og inkubation og levetid er lånt fra den beslægtede *Scincus scincus*.

Et enkelt dyr skal have mindst 90 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde). Gulvarealet er vigtigere end højden. Lav bunden af mindst 10 cm fugtigholdende sand, blandet med lidt ler eller jord, så gangene ikke styrter sammen, og læg flade sten og kork på terrariets bund, så dyret ikke kan grave dem ned over sig. Byg et mørkt skjul, og dæk gerne tre sider af terrariet, så dyret føler sig sikkert.

To dyr kan holdes sammen i større terrarier, hvis der er plads, men arten er ikke social, og hanner må ikke holdes sammen. Er kønnet ukendt, er det sikrest at holde dyrene hver for sig. Terrariet skal have tæt, flugtsikkert låg og god ventilation.

Læs mere: Inkubation af æg

TEMPERATUR

Om dagen skal luften være 27-30 °C, og under en varmelampe skal et skjul eller en flad sten nå 35-38 °C målt med et infrarødt termometer. Sæt en termostat på varmen. Om natten skal temperaturen være 20-25 °C. Den kølige side af terrariet skal ligge på 24-27 °C, så dyret kan vælge.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være lav, 20-45 %, med god ventilation. Giv et fugtigt skjul på den kølige side, hvor bunden under et stykke bark eller sten holdes fugtig; det hjælper ved hudskifte. En lav vandskål med frisk vand skal altid stå fremme og skiftes dagligt.

Læs mere: Luftfugtighed, forstøvning og ventilation

LYS OG UVB

Scincopus fasciatus er nataktiv, men svagt UVB (Ferguson-zone 1) anbefales. Brug et UVB-rør i reflektor over solpladsen og lad dyret kunne trække sig tilbage i skygge. UVB trænger ikke gennem glas eller plast, og rørene skiftes efter fabrikantens anvisning.

Lysperioden er 11 timer om vinteren og 13 timer om sommeren. Hold varmelamper slukket om natten, og brug en varmekilde uden lys, hvis det er nødvendigt.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Scincopus fasciatus æder mest insekter som kakerlakker, fårekyllinger, melorme, silkeorme og larver af den sorte soldaterflue. Lidt grønt og frugt kan tilbydes som tillæg. Foderdyrene må ikke være større end dyrets hoved. Unge dyr fodres dagligt, og voksne hver anden eller tredje dag med det, de kan æde på omkring fem minutter.

Drys foderdyrene let med kalk og med et vitamintilskud en gang imellem; for meget vitamin er skadeligt. Brug pincet, så dyret ikke sluger sand.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er rolig og tåler håndtering, men er mest aktiv om natten og tilbringer dagen under jorden. Ved nye dyr er det bedst at lade dem være i fred i to til tre uger, indtil de æder jævnt. Tag ikke dyret ovenfra, men skub en hånd ind under det fra siden og støt hele kroppen.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Alderen ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret. Kønnene er svære at skelne, og to dyr, der holdes sammen, kan vise sig at være to hanner, som kan skade hinanden.

PARRING

Parringen i fangenskab er ikke beskrevet, og hvilke forhold der udløser den, er ikke dokumenteret. Hold hanner adskilt, og sæt kun en han og en hun sammen i et stort terrarie med mange skjul. Hunnen skal have sine egne skjul, og dyrene skilles ad, hvis de bider.

ÆGLÆGNING OG KULD

Arten lægger æg. I fangenskab er der registreret kuld på 4-5 æg; hvor mange kuld en hun lægger om året, er ikke dokumenteret. En hun, der skal lægge æg, har brug for en dyb, let fugtig bund af sand, hvor hun kan grave en rede.

INKUBATION

Æggene flyttes forsigtigt med samme side opad til en lukket kasse med let fugtigt vermiculit ved jævne 27-30 °C. Inkubationen varer 50-70 dage. Tjek ugentligt, at underlaget er let fugtigt, og at ingen æg mugner.

OPDRÆT AF UNGER

Opdræt af unger er ikke beskrevet. Unge dyr fodres dagligt med små insekter og holdes hver for sig i et terrarie med dyb, let fugtig bund og et mørkt skjul.

Sundhed og typiske fejl

Scincopus fasciatus er hårdfør, når temperatur og bund er rigtige. De typiske problemer er:

- Indvendige parasitter, især hos vildfangede dyr; få afføringen undersøgt hos en dyrlæge.
- Kalkmangel ved ensidig kost.
- Tarmforstoppelse ved for store foderdyr eller sandslugning.
- Hudproblemer og luftvejsinfektion ved en for fugtig bund.
- Stress hos nyindførte, vildfangede dyr.

Sæt nye dyr i karantæne i mindst en måned. Dyrene skjuler sygdom godt, så kontakt en dyrlæge med erfaring i krybdyr ved ændret appetit, vægttab eller hævelser.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.